

Cassipourea congoensis

Rubiaceae (62)

Aidia genipiflora
Borreria filifolia
Borreria octodon
Borreria ocymoides
Borreria radiata
Borreria scabra
Borreria stachydea
Canthium cornelia
Canthium horizontale
Canthium mannii
Canthium multiflorum
Canthium venosum
Crossopteryx febrifuga
Feretia apodanthera
Feretia canthioides
Gardenia aqualla
Gardenia erubescens
Gardenia imperialis
Gardenia sokotensis
Gardenia ternifolia
Gardenia triacantha
Geophila lancistipulata
Geophila obvallata
Grumillea venosa
Hallea stipulosa
Ixora brachypoda
Ixora laxiflora
Keetia cornelia
Keetia mannii
Keetia venosum
Kohautia confusa
Kohautia senegalensis
Leptactina senegambica
Macrosphyra longistyla
Microdesmis puberula
Mitracarpus scaber
Morelia senegalensis
Morinda geminata
Morinda lucida
Nauclera latifolia
Neorosea chevalieri
Oldenlandia capensis
Oldenlandia corymbosa
Oldenlandia goreensis
Oldenlandia herbacea
Oldenlandia lancifolia
Pausinystalia macroceras
Pavetta cinereifolia
Pavetta oblongifolia
Polysphaeria arbuscula
Pouchetia africana
Psychotria psychotrioides
Psydrax parviflora
Rothmannia whitfieldi
Rytigynia canthioides
Rytigynia senegalensis
Sarcocephalus latifolius
Sarcocephalus pobeguini
Spermocoe ruelliae
Tricalysia okelensis
Vangueriopsis discolor
Virectaria multiflora

Rutaceae (2)

Figara lepreurii
Zanthoxylum lepreurii

Salicaceae (3)

Salix chevalieri
Salix coluteoides
Salix subserrata

Supindaceae (6)

Allophylus africanus

Cardiospermum halicacabum
Lecaniodiscus cupanioides
Lepisanthes senegalensis
Paullinia pinnata
Zanha golungensis

Sapotaceae (7)

Butyrospermum parkii
Malacantha abrifolia
Manilkara multinervis
Manilkara obovata
Omphalocarpum bibracteatum
Omphalocarpum pachysteloides
Pachystela pobeguini

Scrophulariaceae (17)

Alectra sessiliflora
Bacopa crenata
Bacopa floribunda
Bacopa hamiltoniana
Buchnera hispida
Buchnera leptostachya
Craterostigma gracile
Craterostigma schweinfurthii
Dopatrium senegalense
Linnophila barteri
Lindernia debilis
Micrargeria filiformis
Rhamphicarpa fistulosa
Scoparia dulcis
Striga bilabiata
Striga hermonthea
Striga macrantha

Selaginellaceae (1)

Selaginella subcordata

Simaroubaceae (3)

Hannoa undulata
Maytenus senegalensis
Quassia undulata

Smilacaceae (1)

Smilax kraussiana

Solanaceae (5)

Datura fastuosa
Datura stramonium
Physalis micrantha
Physalis unguata
Schwenkia americana

Sphenocleaceae (2)

Sphenoclea dalzielii
Sphenoclea zeylanica

Sterculiaceae (9)

Cola cordifolia
Cola laurifolia
Dombeya quinqueseta
Melochia corchorifolia
Melochia melissifolia
Sterculia setigera
Sterculia tragacantha
Waltheria indica
Waltheria lanceolata

Taccaceae (1)

Tacca portulacifolium

Thelypteridaceae (1)

Cyclosorus goggilodus

Thymeleaceae (1)

Gnidia foliosa

Tiliaceae (15)

Christiana africana
Corchorus aestuans
Corchorus fascicularis
Corchorus olitorius
Corchorus tridens
Grewia bicolor
Grewia cissoides
Grewia flavescens
Grewia lasiodiscus
Grewia tenax
Grewia venusta
Grewia villosa
Triumfetta heudelotii
Triumfetta pentandra
Triumfetta rhomboidea

Ulmaceae (2)

Celtis integrifolia
Trema orientalis

Urticaceae (2)

Pouzolzia denudata
Pouzolzia guineensis

Verbenaceae (10)

Clerodendrum acerbianum
Clerodendrum capitatum
Clerodendrum volubile
Lantana rhodesiensis
Lantana viburnoides
Lippia chevalieri
Stachytarpheta angustifolia
Tectona grandis
Vitex doniana
Vitex madiensis

Vitaceae (12)

Ampelocissus leonensis
Cayratia gracilis
Cissus aralioides
Cissus gracilipes
Cissus populnea
Cissus producta
Cissus quadrangularis
Cissus rufescens
Cissus vogelii
Cyphostemma adenocaulis
Cyphostemma vogelii
Cyphostemma waterlotii
Xyridaceae (5)
Xyris anceps
Xyris barteri
Xyris capensis
Xyris minima
Xyris staminea

Zingiberaceae (3)

Aframomum latifolium
Costus spectabilis
Kaempferia aethiopica

Zygophyllaceae (2)

Balanites aegyptiaca
Tribulus terrestris

II.2. PRESENTATION DES ESPECES VEGETALES PRINCIPALES DU PNNK

Afzelia africana Sm. ex Pers. (Caesalpinaceae)

Noms vernaculaires : Badiaranké : *Bhesasa*; Bassari : *Andalēdalē*; Peuhl : *Lengué*.

Afzelia africana est un arbre pouvant atteindre 30 mètres de haut. Le tronc présente une écorce écailleuse. Les fleurs, parfumées, sont blanches et parfois rayées de pourpre violacé. La floraison a lieu entre les mois de février et avril. Le fruit est une gousse ligneuse aplatie, renfermant des graines noires arrondies, coiffées d'une capsule jaune orange vif. Cette gousse s'ouvre violemment en libérant les graines.

Cet arbre est une espèce de transition entre la forêt sèche et la forêt humide. Il pousse bien sur les sols sableux profonds dans les savanes, les forêts claires et les galeries forestières où il est généralement disséminé. Il apparaît parfois de façon grégaire en terrain rocailleux, au niveau des escarpements et des pentes des collines des monts Assirik dans le Parc National du Niokolo Koba. L'arbre est défeuillé de novembre à décembre.

La plante procure un excellent bois d'oeuvre. Les jeunes pousses et les rejets sont broutés par les antilopes. Alors que les fleurs sont consommées par les roussettes. Cette espèce a des propriétés galactogènes, vermifuges et insecticides. L'arbre présente de nombreux usages en médecine locale (fièvre, maux de ventre, dysenterie, asthme, bronchite, hypertension, lèpre, courbatures, tétanos, maladie du sommeil, empoisonnement, blennorragie, hernies, traitement des plaies). Cette plante est par ailleurs considérée comme un arbre mystique et souvent choisie comme arbre à palabre chez certaines ethnies. Les graines qui servent de jouets seraient un violent poison.

Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. et Perr. (Combretaceae)

Noms vernaculaires : Bassari : *A Ngan*; Peuhl : *Kédéli, Kodoli, Godoli, Hodoli*.

Anogeissus leiocarpus est un arbre atteignant 30 mètres de haut. Les feuilles sont opposées à subopposées. Les fleurs sont de couleur vert jaune à blanc crème. La floraison a lieu de juin à septembre. Les fruits sont de petits cônes sphériques ou ovoïdes formés d'écailles imbriquées.

L'arbre forme souvent des peuplements presque purs et denses autour des mares, dans les vallées alluviales et les forêts galeries. Il préfère les sols modérément humides. Cet arbre garde ses feuilles de mars à décembre-janvier.

Anogeissus leiocarpus procure un bon bois d'oeuvre et de service. C'est un excellent bois de chauffe et de carbonisation. Les feuilles produisent une teinture jaune utilisée pour les peaux et les tissus. L'arbre est utilisé dans le traitement de plusieurs maladies (fièvre, diarrhée, dermatoses, ulcères, cicatrisation des plaies, maux de dents, parasitoses intestinales, menstruations irrégulières) et présente des propriétés stimulantes, aphrodisiaques, et vermifuges.

Bombax costatum Pellegr. et Vuillet (Bombacaceae)

Noms vernaculaires : Bassari : *O Ngavré, Anga Uri* ; Mandingue : *Bukuhu, Bukungo* ; Peuhl : *Bumbuvi, Dohé, Doy, Doyé, Kuluhi, Kuruhi*.

Bombax costatum est un arbre pouvant dépasser 25 mètres de haut. Le tronc, hérissé d'épines coniques à pointes fines, présente une écorce liégeuse, épaisse, brun gris. Cet arbre de savane et de forêts sèches, pousse sur des terrains arides, parfois même latéritiques. Les souches des arbres coupés rejettent assez bien. Les individus adultes supportent les feux de brousse à cause de leur écorce subéreuse. La plante fleurit après la chute des feuilles (janvier-février). Les fleurs en forme de tulipe sont de couleur rouge éclatant. La pollinisation de *Bombax costatum* est assurée par des oiseaux. Les fruits mûres libèrent le kapok vers le mois de mars. Cette espèce procure un bois blanc et léger utilisé surtout comme bois de service (industrie des allumettes). Les fleurs sont très consommées par les animaux et servent aussi dans l'alimentation humaine (préparation de sauces). Le kapok est collecté par les populations pour le rembourrage de coussins. L'arbre présente de nombreux emplois dans la médecine locale (fièvre, maux de coeur, dermatose, stimulation de la lactation et accouchement).

***Borassus aethiopum* Mart. (Arecaceae)**

Noms vernaculaires : Français : Rônier ; Mandingue : *Sibo*.

Borassus aethiopum est un grand palmier pouvant atteindre 30 mètres de haut. Il présente des feuilles longuement pétiolées et palmées. Le tronc est simple, droit, cylindrique et présente un renflement vers sa deuxième moitié chez les pieds adultes. Les inflorescences mâles et femelles sont portées par des pieds différents (espèce dioïque). Les fruits groupés en régimes sont ovoïdes ou globuleux, fibreux, aromatiques. Ce palmier se rencontre souvent sur des sols sablo-limoneux ou alluvionnaires profonds et bien drainés, dans des zones où la nappe phréatique est située à une faible profondeur. *Borassus aethiopum* forme d'importants peuplements dans les zones dépressionnaires et sur les berges du fleuve Gambie et de ses principaux affluents dans le Parc National du Niokolo koba. La floraison et la fructification de ce palmier interviennent dès la fin de la saison des pluies, de septembre à novembre. Ce palmier fournit un bois de service de qualité. Les feuilles servent à la confection de toitures de cases et de paniers. A maturité, la partie charnue du fruit (mésocarpe) est consommée par la faune sauvage (éléphants et singes). Le cotylédon de la noix en germination et la première feuille de la plantule constituent un appoint alimentaire. La base du bourgeon (jeunes feuilles) communément appelée cœur du rônier est comestible. La sève fermentée constitue une boisson (vin). Les produits du rônier sont utilisés dans le traitement de maladies : constipation, maux de ventre, maux de gorge, toux, bronchite, dermatoses, hémorragies, maladies sexuellement transmissibles, escarres et parasitoses intestinales. Les épis des inflorescences mâles produisent un bon engrais potassique. *Borassus aethiopum* est l'une des espèces les plus utilisées au Sahel. Les peuplements de l'espèce connaissent presque partout une dégradation essentiellement liée aux activités de l'homme. La coupe de l'arbre est strictement réglementée au Sénégal.

***Capparis tomentosa* Lam. (Capparidaceae)**

Noms vernaculaires : Français : Câprier tomenteux, Câprier d'Afrique; Peuhl : *Gubi Balédé, Gumi Dalévi, Gumi Balévi*.

Capparis tomentosa est une liane munies d'une paires d'épines crochues au point d'insertion des feuilles sur la tige. Les fleurs sont blanches ou roses. Le fruit est ovoïde ou sphérique, de couleur jaune rouge à maturité. La floraison a lieu au mois de mars sur des pieds feuillés. La plante se retrouve sur les sols sableux, les limons des berges du fleuve Gambie, les sols argileux des bordures de mare, les sols pierreux, ou à proximité des termitières en zone de savane. *Capparis tomentosa* est très utilisée en médecine traditionnelle : morsures de serpent, blessures, ulcères, empoisonnement, ophtalmies, blennorrhagie... La plante a des propriétés diurétiques et laxatives. Les feuilles, les racines et les fruits seraient toxiques.

***Cassia sieberiana* DC. (Mimosaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *Angéchékéché*; Coniagui : *Ntyëntënté*; Français : Casse du Sénégal; Mandingue : *Sindang*; Peuhl : *Sindya, Endgi*; Tandanké : *Ganaté Bembo, Madaga*.

Cassia sieberiana est un arbuste pouvant atteindre 7 mètres de haut. L'écorce du tronc est noirâtre. Les feuilles sont alternes. Les fleurs, de couleur jaune d'or, forment des grappes longues et pendantes. La floraison survient en mars - avril quand l'arbre est défeuillé. Le fruit est une longue gousse cylindrique, ligneuse, également pendante. et arbuste assez commun est généralement observé sur les sols humides et bien drainés des galeries forestières. La plante procure un bon bois de service et de chauffe. Elle est très utilisée dans la pharmacopée : fatigue, fièvre, paludisme, maux de tête, maux de ventre, diarrhée, dysenterie, constipation, toux, onchocercose, lèpre, varicelle, dermatoses, jaunisse, brûlures, bilharziose, peste aviaire des pintades impuissance sexuelle, maladies vénériennes, blennorrhagie. Les populations lui reconnaissent des propriétés aphrodisiaques, laxatives, vermifuges, diurétiques et purgatives,

***Ceiba pentandra* (L.) Gaertn. (Bombacaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *Andiné* ; Français : Fromager, Kapokier; Mandingue : *Banta*; Peuhl : *Bantan, Bantigéhi, Bantinévi, Ganki*.

Ceiba pentandra est un géant arbre pouvant dépasser 30 mètres de haut. La base de cet arbre est muni de grands contreforts. Le tronc généralement droit et les branches présentent de grosses épines coniques. Les feuilles sont alternes et digitées. Les fleurs, pollinisée par les chauves-souris, sont de couleur blanc verdâtre. La floraison a généralement lieu en même temps que la défeuillaison, de novembre à janvier Les fruits sont des capsules

déhiscentes qui, en avril-mai, s'ouvrent et laissent échapper le kapok (très inflammable) qui est souvent la cause d'incendies dans les villages où cette espèce est abondante. Cet arbre est assez fréquent dans les forêts galeries du Parc et dans les sites des anciens villages où il est planté par les populations comme arbre d'ombrage. Le bois très léger est utilisé pour la fabrication de pirogues et d'ustensiles de ménage. Les graines produisent une huile très agréable. La plante présente de nombreux usages médicaux : paludisme, fièvres, céphalées, vertiges, maladies mentales, épilepsie, asthme, maux de ventre, constipation, diarrhée, dysenterie, variole et varicelle, anémie, maux de dents, gingivites, panaris, conjonctivite, rachitisme infantile, tétanos et blennorragie. Certains produits de l'arbre sont utilisés comme vomitif pour dissiper l'ivresse.

***Celtis integrifolia* Lam. (Ulmaceae)**

Celtis integrifolia est un arbre pouvant atteindre 18 mètres de haut. Les fleurs sont de couleur verdâtre. La floraison a lieu de décembre à mai. Les fruits sont des drupes ovoïdes.

Cet arbre pousse sur les berges de la Gambie et dans les galeries forestières, les bas-fonds et les bordures de mares. Les feuilles entrent dans la préparation de repas et servent de fourrage en saison sèche. La plante est utilisée dans le traitement de plusieurs maladies : asthénies, migraines, rhumatisme, oedèmes, abcès et stérilité.

***Cochlospermum tinctorium* A. Rich. (Cochlospermaceae)**

Noms vernaculaires : Peuhl : *Danduré, Dandéré, Darundé, Fadurandé.*

Cochlospermum tinctorium est une plante ligneuse, haute de 30 à 80 centimètres. Les fleurs sont de couleur jaune d'or et apparaissent de façon spectaculaire au ras du sol ou au sommet de racèmes hauts de 5 à 10 centimètres. La floraison, stimulée par le passage des feux de brousse, a lieu de décembre à mars. Le fruit est une capsule ovoïde et déhiscence contenant une bourre soyeuse. Cette espèce se rencontre surtout sur les sols argileux compacts des savanes sur plateaux. La racine jaune ou rouge foncé, semi-tubéreuse, peut être consommée après élimination d'une substance toxique qu'elle contient. Elle est utilisée en teinturerie et présente de nombreux usages médicaux : fièvre jaune, maux de ventre, hémorroïdes, pneumonie, affections des bronches, conjonctivites, affections hépato-biliaires, bilharziose, indigestion, morsures de serpents, diarrhée des veaux. Cette espèce présente des propriétés diurétiques, purgatives, décongestives et vaso-constrictives pour les veines.

***Cola cordifolia* (Cav.) R.Br. (Sterculiaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *Ambambè*; Coniagui : *N'rhimpè*; Français : Faux colatier; Mandingue : *Tabo*; Peuhl : *Goumbambè, Taba.*

Cola cordifolia est un arbre pouvant atteindre 30 mètres de haut. Il présente de larges feuilles simples, cordées, plus ou moins lobées et alternes. Les fleurs sont de couleur jaune orange ; elle s'épanouissent de février à avril. Les fruits sont des capsules réniformes de couleur rouge ou jaune, disposés par 4 à 5 en étoile ; ils mûrissent aux mois de juillet et août. Cette espèce est surtout observée dans les galeries forestières et dans les forêts claires et certaines savanes boisées. Les graines des fruits mûres sont entourées d'une pulpe très sucrée et comestible. Les fibres du tronc sont utilisées pour fabriquer des cordes. L'arbre est utilisé dans le traitement de la lèpre, de la bronchite et autres maladies pulmonaires.

***Combretum glutinosum* Perrott ex DC. (Combretaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *A Ndékar*; Mandingue : *Djambacatan*; Peuhl : *Dôki, Dôko, Dokigori, Ndoki, Dôgé.*

Combretum glutinosum est un arbuste qui peut atteindre 7 mètres de haut. Les feuilles sont polymorphes, généralement verticillées par quatre, mais pouvant être opposées, ou même alternes. Les fleurs sont odorantes, de couleur jaune-verdâtre. La floraison a lieu à partir du mois de mars. Les fruits présentent quatre ailes glabres ou peu pubescentes. *Combretum glutinosum* est une espèce très commune, généralement grégaire, poussant sur différents types de substrat (sols sableux, argileux, pierreux, cuirasse latéritique). C'est l'espèce ligneuse la plus représentée dans le Parc National du Niokolo koba, en particulier sur les plateaux. Cet arbuste résiste relativement bien aux feux de brousse. Il est parfois parasité (dans la zone de Badi) par une loranthacée, *Englerina lecardii*, qui a des fleurs jaunâtres. *Combretum glutinosum* procure un bois de chauffe et de carbonisation de qualité. Il est très utilisé dans la teinturerie. Les populations l'utilisent dans le traitement de plusieurs maladies : fièvres, céphalée, rhume, paludisme, lithiase rénale, albuminurie, toux, vomissements, maux

de ventre, maux d'estomac, constipation, colique, blessures, hémorragies et anémie. Il a en plus des propriétés diurétiques.

***Cordyla pinnata* (Lepr.) Milne-Redh. (Caesalpiniaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *A Ngud, A Ngul* ; Français : Manguier sauvage ; Mandingue : *Duto, Kono Duto, Ulakomo Duto* ; Peuhl : *Douki*; Tandanké : *Dudé, Di Vut*.

Cordyla pinnata est un arbre qui peut atteindre 20 mètres de haut. Son tronc présente une écorce crevassée en petits rectangles. Ses feuilles sont alternes et imparipennées. Les fleurs, de couleur verdâtre, sont très odorantes. La floraison a lieu en période de défeuillaison, de février à avril. Le fruit est une drupe globuleuse ou obovale. Cet arbre préfère les sols alluvionnaires ou sableux. Les individus de cette espèce forment des parcs présentant parfois des peuplements presque purs. L'arbre procure un très bon bois d'artisanat et de service. La pulpe blanche des fruits, riche en vitamine C, phosphore, fer et lysine, est comestible et est utilisée dans la préparation de sauces. Les jeunes feuilles sont très consommées par le bétail et la faune sauvage. *Cordyla pinnata* est utilisée dans le traitement de nombreuses maladies : céphalées, rhinites, conjonctivite, abcès, oedèmes, courbatures, diarrhée, coliques, maux de ventre, maux du foie. Il présente en outre des propriétés vermifuges, diurétiques, laxatives et est utilisé en médecine vétérinaire.

***Daniellia oliveri* (Rolfe) Hutch. et Dalziel (Caesalpiniaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *Andabhè, A Ndèp, A Ndap*; Coniagui : *Taakè, Tak*; Mandingue : *Santan, Santango, Utand*; Peuhl : *Thiéwè, Tévi, Tévédi, Tévé, Karlahi, Kaha, Kayèlahi*.

Daniellia oliveri est un arbre pouvant dépasser 20 mètres de haut. Son écorce écailleuse est de couleur gris cendré. Les feuilles sont alternes et paripennées. Les fleurs sont blanches à verdâtres. La floraison intervient en février-mars sur les arbres feuillés. Le fruit est une gousse plate, obovale. Cet arbre pousse parfois en peuplements, essentiellement sur des terrains sableux ; il se retrouve dans les savanes arborée à boisées, notamment sur les pentes des collines. L'arbre produit un bon bois d'oeuvre et de service. Les jeunes feuilles sont consommées par les antilopes. La résine est brûlée dans les maisons comme encens et pour chasser les insectes. Les graines sont comestibles. La plante présente de nombreux usages médicinaux : courbatures fébriles, fièvres, céphalées et migraines, angine, tuberculose, bronchite, hémorroïde, coliques intestinales, plaies, dermatoses, morsures de serpents.

***Dichrostachys cinerea* (L.) Wight et Arn. (Mimosaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *A Ndemband, A Mbukruka*; Français : Mimosa clochette; Mandingue : *Kururunganèv, Modikananèv, Kururi Naningo, Nganikoyo*; Peuhl : *Burlé, Burli, Patrulali*.

Dichrostachys cinerea est un arbuste épineux parfois buissonnant, à feuilles alternes et bipennées, pouvant atteindre 7 mètres de haut. Les fleurs, de couleur jaune d'or, sont odorantes. La floraison a lieu de février à juin quand l'arbre a perdu ses feuilles. Les fruits sont des gousses indéhiscentes entortillées et enchevêtrées. Cette plante pousse bien sur les sols argileux et forme parfois des fourrés impénétrables. Elle a un grand pouvoir de drageonnement. Cet arbuste est utilisé comme bois de service, de feu et de charbonnage. Les fruits et les feuilles sont consommés par les animaux. Il fait l'objet de nombreuses utilisations médicinales : morsure de serpent, toux et coqueluche des enfants, affections pulmonaires et gastro-intestinales, dysenterie, lèpre, éléphantiasis, eczéma, furonculoses, abcès, oedèmes, maux de dents.

***Diospyros mespiliformis* Hochst. ex A.DC. (Ebenaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *A Nganga, A Nkanka*; Français : Faux ébénier, Ebénier de l'Ouest Africain, plaqueminier, Kaki de brousse; Peuhl : *Koukou, Nèlbé, Nèlbi, Pomponi, Tolé*.

Diospyros mespiliformis est un arbre sempervirent pouvant dépasser 20 mètres de haut. Son tronc présente une écorce noire. Les jeunes feuilles sont rougeâtres. Les fleurs sont de couleur blanchâtre. La floraison a lieu d'avril à mai. Les fruits sont des baies suborbiculaires, de couleur jaunâtre. *Diospyros mespiliformis* pousse généralement sur les berges des cours d'eau. Le bois est utilisé dans l'artisanat (ébène du Nigéria). Les feuilles constituent un fourrage pour les animaux. Les fruits contiennent une pulpe sucrée comestible. La maturité des fruits survient entre les mois d'octobre et février. Cette plante fait l'objet de nombreux usages médicinaux :

fièvre, céphalées, rhume, colique, paludisme, amibiase, diarrhée, maux de ventre, maux de dents, pneumonie, lèpre, gale, plaie, onchocercose.

***Erythrophleum africanum* (Welw. ex Benth.) Harms (Caesalpiniaceae)**

Noms vernaculaires : Mandingue : *Kursonsung, Kéko*; Peuhl : *Pèl, Pelli*.

Erythrophleum africanum est un arbre pouvant atteindre 15 mètres de haut. Le tronc présente une écorce écaillée, gris noirâtre. Les fleurs sont denses, odorantes, de couleur blanche jaunâtre. La floraison a lieu de janvier à mars. Les fruits sont des gousses ligneuses, aplaties et oblongues. Cette plante se retrouve sur des sols légers, dans les forêts galerie et les forêts claires. L'arbre reste défeuillé pendant toute la saison sèche. Cette espèce procure un bon bois d'oeuvre et de service.

***Hexalobus monopetalus* (A. Rich.) Engl. et Diels (Annonaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *A Pèhji, A Pèyi*; Coniagui : *A Pin*; Peuhl : *Boylé, Koéli, Koilé, Boili*.

Hexalobus monopetalus est un arbuste pouvant atteindre 7 mètres de haut. Les feuilles, odorantes au frottement, sont alternes, elliptiques ou oblongues. Les fleurs sont de couleur blanc crème à jaune pâle et sont également odorantes. Les fruits de couleur rouge à maturité sont oblongs. Cet arbuste assez commun n'est pas exigeant quant aux conditions du sol. On le trouve sur des substrats rocheux en bordure des galeries forestières et dans les savanes. Le tronc de l'arbre est un bon bois de service. L'écorce est utilisée pour la fabrication de cordes. Les fruits sont sucrés et comestibles. Cette plante présente de nombreux usages médicaux : rhumes, diarrhée, coliques, maux de poitrine, affections des yeux et maladies vénériennes.

***Lannea acida* A. Rich. (Anacardiaceae)**

Noms vernaculaires : Coniagui : *Atékemu*; Mandingue : *Bèmbo*; Peuhl : *Tuko, Tingóli, Bèmbèy, Tinguli*; Tandanké : *Gi purub*.

Lannea acida est un arbre qui peut atteindre 10 mètres de haut. L'écorce est craquelée ou lisse. Les fleurs, de couleur jaune verdâtre, ont une odeur agréable. La floraison a lieu en mai-juin sur les arbres défeuillés. Le fruit est une petite baie ellipsoïde, de couleur rouge jaune à maturité. La plante se rencontre aussi bien sur les plateaux cuirassés que sur les sols profonds. Relativement commune, on la rencontre de façon dispersée dans les savanes. Les fruits, légèrement acidulés, sont comestibles. Diverses parties de l'arbre sont utilisées dans le traitement de différentes maladies : troubles gastriques, dysenterie, scorbut, rachitisme, bilharziose, caries dentaires, dermatoses.

***Lonchocarpus laxiflorus* Guill. et Perr. (Fabaceae)**

Noms vernaculaires : Mandingue : *Moro Iro*; Peuhl : *Ranéranéhi, Dafinay, Banigolombi, Kadoda*.

Lonchocarpus laxiflorus est un arbuste de 5 à 6 mètres de haut. L'écorce de son tronc est gris jaune et légèrement crevassée. Les fleurs sont mauves violacées. Cette espèce fleurit en mars-avril pendant la période de défeuillaison. Le fruit est une gousse elliptique plate, pendante, de couleur jaune. Cet arbuste peu commun se retrouve dispersé dans les savanes.

***Mimosa pigra* L. (Mimosaceae)**

Noms vernaculaires : Mandingue : *Moro Doho*.

Mimosa pigra est un arbuste épineux et buissonnant de 1 à 2 mètres de haut. Les feuilles sont alternes et bipennées. Les fleurs sont blanches rosées. La floraison a lieu de septembre à décembre sur les plantes feuillées. Les fruits sont des gousses plates recouvertes de poils raides, entrecroisés, de couleur brun. La plante pousse dans des zones inondées pendant longtemps (mares de Simenti, Kountadala) ou sur les berges des cours d'eau. Elle forme des fourrés impénétrables dans certaines mares. Cette plante est utilisée dans le traitement de maladies comme fièvres, rhume de cerveau, rhumatisme, obésité, maux de dents, maladies oculaires et morsures de serpents.

***Mitragyna inermis* (Willd.) O. Ktze. (Rubiaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *Gogo Golèr, A Ngonèr*; Français : Pied d'éléphant; Mandingue : *Do, Diuho, Dioho, Diu, Diudium*; Peuhl : *Teumbi, Kotei, Kodi, Ngoboli*.

Mitragyna inermis est un arbre bas-branchu, pouvant atteindre 16 mètres de haut. Les fleurs sont très odorantes et de couleur blanche légèrement teintée de jaune. La floraison a lieu de mai à septembre. Le fruit est sec et déhiscent. Les individus de cette espèce forment des fourrés denses dans les bas-fonds argileux ou limoneux inondés pendant plusieurs mois, au bord des mares et le long des rives de cours d'eau. *Mitragyna inermis* reste défeuillé en saison sèche (de janvier à juin). La plante procure du bois de service (perches). La plante est très utilisée dans la pharmacopée : fièvre, paludisme, constipation, maux d'estomac, maux de ventre, stérilité des vaches... Elle a des propriétés diurétiques.

***Neocarya macrophylla* (Sabine) Prance (Chrysobalanaceae)**

Synonyme : *Parinari macrophylla* Sabine

Noms vernaculaires : Badiaranké : *Mafayhè*; Bassari : *Anoyè*; Français : Sougué à grand fruit; Peuhl : *Koura bansouma*.

Neocarya macrophylla est un petit arbre ou un arbuste d'environ 8 mètres de haut. Les fleurs sont de couleur blanche ou rosée. La floraison a généralement lieu de février à juin. Le fruit est une drupe ellipsoïde, de couleur brun jaunâtre, avec un gros noyau dur. Cet arbuste est très localisé et forme de petits peuplements sur les sables, en bordure des dépressions, et parfois sur des grès recouverts par une mince couche de sable en zone de savane. La pulpe du fruit est sucrée et comestible. La graine consommée est très riche en huile. Cette plante est utilisée dans le traitement des rhumatismes articulaires.

***Nymphaea lotus* L. (Nymphaeaceae)**

Noms vernaculaires : Français : Nénuphar; Mandingue : *Ko bayo*; Peuhl : *Tabé, Ndayri, Taydé, Tabéré Taggal*.

Nymphaea lotus est une plante aquatique à feuilles appliquées sur l'eau. Le bord des feuilles est largement denté. Les fleurs épanouies sont de couleur blanche. La floraison intervient en août-septembre. C'est le plus grand des nénuphars du Sénégal. Cette plante commune se rencontre dans les mares, le bord des cours d'eau, là où le courant n'est pas trop rapide. Les fruits, riches en amidon, sont comestibles (aliment de disette). Les bulbes sont farineux et sont consommés grillés ou bouillis comme des pommes de terres. Cette plante est utilisée en médecine traditionnelle : fièvres, gale, hémorroïdes, ulcères, affection des voies respiratoires, inflammations du bas-ventre, maladie mentale, insomnies, jaunisse.

***Oxytenanthera abyssinica* (A.Rich.) Munro (Poaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *Angathiè*; Français : Bambou; Peuhl : *Kewè*.

Oxytenanthera abyssinica est une plante herbacée ligneuse à feuilles oblongues, pouvant atteindre 15 mètres de haut. Les fleurs sont de couleur vert jaune. Le bambou ne fleurit et ne fructifie qu'une fois tous les sept ou huit ans. Après la fructification, la plante disparaît. Cette herbacée géante se reproduit soit par germination de graines, soit par multiplication végétative. Généralement grégaire, la plante présente une répartition irrégulière. On la retrouve souvent sur les collines ou le long des cours d'eau temporaire. La plante produit un bois de service très utilisé en milieu rural et urbain. Les feuilles et les jeunes rhizomes sont consommés par les animaux. Elle est utilisée dans la médecine locale pour traiter les fractures, les migraines, l'hypertension, les oedèmes, et les plaies. L'exploitation abusive, les feux de brousse et la dégradation des sites appropriés pour son développement constituent des menaces pour cette espèce.

***Parkia biglobosa* (Jacq.) Benth. (Mimosaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *Andiambanè*; Français : Mimosa pourpre, Néré, Arbre à farine; Mandingue : *Neto*; Peuhl : *Netè*.

Parkia biglobosa est un arbre pouvant atteindre 20 mètres de haut avec une cime généralement étalée en parasol. Les inflorescences se présentent en boules rouges ou roses suspendues à l'extrémité d'un pédoncule. Le

fruit est une longue gousse aplatie, légèrement arquée. La floraison et la fructification interviennent entre les mois de janvier et juillet. L'arbre pousse sur les terrains sablonneux. Répandu dans les savanes et les forêts sèches, il est souvent protégé dans les champs du fait de ses usages multiples. La plante est très utilisée du fait de sa grande valeur nutritionnelle et de son importance dans la pharmacopée. La pulpe des fruits est riche en glucide (80%) en sels minéraux (calcium, phosphore) en vitamines (A et C). Les graines sont riches en protéines (35%), en matières grasses (29%) et en glucides (16%) et sont utilisées comme condiment. Différentes parties de l'arbre sont utilisées pour traiter différentes maladies : fièvre, paludisme, anorexie, dysenterie, hémorroïdes, parasitoses intestinales, bilharziose, filarioses, jaunisse, rougeole, oreillons, blessures. L'arbre est utilisé en tannage et en teinturerie.

***Piliostigma thonningii* (Schum.) Milne-Redh. (Caesalpinaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *A Pès*; Mandingue : *Fara, Fara Damban Méso'ho*; Peuhl : *Barkalléhi, Barkévi, Barkéo*.

Piliostigma thonningii est un petit arbre pouvant atteindre 10 mètres de haut. Les fleurs sont blanches et odorantes. La floraison s'étale de décembre à juin. Le fruit est une gousse aplatie, coriace. La plante pousse sur des endroits relativement humides. Elle est observée dans les savanes arborées, les forêts secondaires et les galeries forestières. Le tronc de cet arbre procure du bois de service. Les feuilles sont broutées par les animaux. L'écorce est exploitée pour confectionner des cordes et des masques. Cette plante est très utilisée en teinturerie et en tannerie. Cette espèce est utilisée en médecine traditionnelle dans le traitement de maladies : maux de dents, céphalées, bains oculaires contre les crachats du serpent cracheur, toux, diarrhée, blessures.

***Pterocarpus erinaceus* Poir. (Fabaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *A Ndag, Andiangué*; Français : Palissandre du Sénégal; Mandingue : *Kéno, Téno*; Peuhl : *Bani, Bani Bané Bari, Baruhi*.

Pterocarpus erinaceus est un arbre à feuilles alternes, imparipennées, pouvant dépasser 15 mètres de haut. Le tronc, généralement droit, présente une écorce écaillée. La fleur, très odorante, est de couleur jaune d'or. La floraison a lieu entre les mois de février et avril, avant la feuillaison. Les fruits, orbiculaires et ailés, comportent au centre de nombreuses soies rigides et épineuses. *Pterocarpus erinaceus* est assez commune dans les savanes boisées ; elle forme des peuplements presque monospécifiques. Cette espèce procure un excellent bois d'oeuvre, de service et d'énergie. C'est un des meilleurs bois d'Afrique Occidentale pour l'ébénisterie. Les feuilles sont exploitées comme fourrage. Cette plante est très utilisée dans le traitement de maladies telles que dysenterie, ulcères chroniques, maux de ventre, maux de dents, toux, maladies oculaires et gonococcie). La plante est menacée de disparition du fait d'une exploitation abusive.

***Saba senegalensis* (A.DC.) Pichon (Apocynaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *Angonwë, A Guge, A Gum* ; Mandingue : *Kaba, Kaba firo*; Peuhl : *Larè, Kamuné, Kurahi*.

Saba senegalensis est une grande liane ligneuse à latex blanc. Les fleurs, observées de janvier à juillet, sont blanches et très odorantes. Le fruit est une grosse baie ovoïde de couleur orange à maturité. Espèce sempervirente très commune, *Saba senegalensis* pousse aussi bien dans les galeries forestières que dans les savanes. Le latex de cette espèce donne un caoutchouc naturel à usages locaux variés. La pulpe du fruit est acidulée et agréable ; elle est utilisée pour produire un jus. Ces fruits sont très consommés par les singes dans le parc. La plante est aussi utilisée en médecine traditionnelle pour traiter : le rhume, les migraines, les coliques, la dysenterie, les vomissements, les intoxications alimentaires, la toux, les plaies, les brûlures. La plante est utilisée en santé animale.

***Sclerocarya birrea* (A. Rich.) Hochst. (Anacardiaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *A Ngud, E Nguit, A Nguk*; Peuhl : *Eri, Hédéi, Hédi, Hébé, Kédé*.

Sclerocarya birrea est un arbre qui peut atteindre 15 mètres de haut. Les fleurs sont vertes et rougeâtres. La floraison a lieu à partir du mois de janvier sur les arbres défeuillés. Les fruits sont des drupes jaunes à maturité (avril). La pulpe de ce fruit, comestible et sucrée, est riche en vitamine C. *Sclerocarya birrea* pousse sur différents types de sol. Assez commune dans les savanes, elle forme parfois des peuplements purs. L'arbre est

utilisé comme bois de service. L'amande de la graine est comestible et contient de l'huile; elle est comestible et vendue sur les marchés locaux. En outre, cette plante est très utilisée en teinturerie et en médecine traditionnelle pour traiter le paludisme, la dysenterie, la constipation, les névralgies, les maux de tête et de dent et les morsures de serpent.

***Securidaca longipedunculata* Fresen. (Polygalaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *Athiéwichè*; Français : Arbre à serpent; Peuhl : *Dioutou*.

Securidaca longipedunculata est un arbuste pouvant atteindre 7 mètres de haut. Ses racines dégagent une odeur caractéristique de salicylate de méthyl. Les fleurs, odorantes, sont de couleur rose ou violette carminée. Cette espèce fleurit d'octobre à décembre. Le fruit, vert ou orange à maturité, présente une grande aile plate. Cette espèce commune se rencontre par individus isolés dans les différents types de savane. Elle pousse sur des sols sableux ou rocheux.

Securidaca longipedunculata est utilisée dans le traitement de maladies : piqûre de serpent, paludisme, diarrhée, maux d'estomac, rhumatisme, convulsion infantile, parasitoses, morsure de chien enragé. Elle a des propriétés vermifuges, répulsives contre les serpents. Elle est broutée par les animaux.

***Spondias mombin* L. (Anacardiaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *Anioka*; Français : Prunier Myrobolan, Prunier Mombin, Mombin jaune; Mandingue : *Ninkôn*; Peuhl : *Thialè*.

Spondias mombin est un arbre qui peut dépasser 15 mètres de haut. Son tronc présente une écorce profondément crevassée. Les fleurs, présentes d'avril à mai, sont blanches et odorantes. Le fruit, en maturité à partir du mois d'août, est une drupe jaune orange. La plante se rencontre généralement dans les galeries forestières. Le fruit est sucré, plus ou moins acidulé. Les racines sont consommées en période de disette. La plante est très utilisée dans la pharmacopée traditionnelle pour soigner : fièvres, dysenterie, constipation, parasitose intestinale, troubles de l'estomac, toux violentes, angines, vomissements, plaies, hémorragies et maux de dents.

***Stereospermum kunthianum* Cham. (Bignoniaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *A Mal*; Mandingue : *Moyra*; Peuhl : *Galumbi, Bani Golumbi, Golombé, Ngahmèd, Dopéléédé*.

Stereospermum kunthianum est un arbre pouvant atteindre 15 mètres de haut. Les fleurs sont de couleur roses lilas ou mauves, odorantes. L'arbre fleurit de novembre à février en période de défeuillaison. Les fruits sont des capsules cylindriques et filiformes renfermant des graines dures. *Stereospermum kunthianum* pousse en général sur des sols argileux, sableux ou rocheux. On le retrouve souvent disséminée dans les galeries forestières, sur les collines et au niveau des affleurements granitiques. Il tolère le feu à cause de la structure de son écorce. Cette plante mellifère procure un bon bois de service et présente de nombreux usages médicinaux : asthénie, coagulation du sang, cicatrisation des plaies, bronchite, pneumonie, dysenterie.

***Strychnos spinosa* Lam. (Loganiaceae)**

Noms vernaculaires : Bassari : *Ko Lit, A Ngolit*; Français : oranger de brousse ; Mandingue : *Fatakulè, Patakulé*; Peuhl : *Fatakulay, Ngorovavi, Ngorval*.

Strychnos spinosa est un arbuste épineux pouvant atteindre 6 mètres de haut. Les fleurs, présentes de février à d'avril, sont blanche verdâtre. Les fruits de couleur jaune à maturité ressemblent à des oranges. Espèce peu exigeante de savane, cette plante pousse sur des sols pierreux ou cuirassés des plateaux et des flancs des collines. C'est une espèce disséminée qui ne forme des peuplements peu étendus. Les fruits sucrés et acidulés sont comestibles. Les feuilles sont consommées par l'homme et la faune sauvage. La coque du fruit sec sert de caisse de résonance pour les instruments de musique. *Strychnos spinosa* est utilisée dans le traitement des maladies suivantes : fièvre, maladies du tube digestif, névralgies, maladies oculaires, syphilis, piqûre de serpents. Les graines du fruit sont vénéneuses.

II.3. LISTE D'INVENTAIRE DE LA FAUNE DU PNNK

1. LES POISSONS

CLASSE	ORDRE	ESPECES	
CLUPEIFORMES	OSTEOGLOSSIDES	Heterotis hasselquistii	
	MORMYRIDES	Mormyrus hasselquistii	
		Mormyrus deliciosus	
		Gnathonemus senegalensis	
		Gnathonemus niger	
		Marcusenius Ihuisii	
		Marcusenius isidori	
		Marcusenius brachyistius	
	GYMNARCHIDES	Gymnarchus niloticus	
	CLUPEIDES	Pelonula afzeliusi	
CYPRINIFORMES	CHARACIDES	Hepsetus odoe	
		Hydrocyon brevis	
		Alestes baremosae	
		Alestes nurse	
		Alestes leuciscus	
		Micralestes septentrionalis	
	CITHARINIDES	Nannaethiopsunitaeniatius	
		Paradistichodus dimidiatus	
		Nannocharax ansorgii	
		Citharinus citharus	
		Labeo senegalensis	
	CYPRINIDES	Labeo Coubie	
		Labeo toboensis	
		Barbus ablabes	
		Barbus sublineatus	
		Barbus niokoloensis	
		Barbus pobeguini	
		Barbus leonensis	
		Barilius senegalensis	
		Chrysichthys walkeri	
		Chrysichthys johnelsi	
		Auchenoglanis occidentalis	
		AMPHILIIDES	Amphilius rheophilus
	MOCHOCIDES		Synodontis clarias
			Synodontis annectens
		Synodontis ocellifer	
		Synodontis gambiensis	
		Synodontis schall	
	MALAPTERURIDES	Malapterurus electricus	
	SCHILBEIDES	Schilbe mystus	
		Parailia spiniserrata	
	CLARIIDES	Clarias senegalensis	
		Clarias macromystax	
Heterobranchus longifilis			
Aphyosemion roloffii			
CYPRINODONTIFORMES	CYPRINIDONTIDES	Epiplatys senegalensis	
		Epiplatys bifasciatus	
		Aplocheilichthys gambiensis	
		Aplocheilichthys paffii	
		Hemichromis fasciatus	
PERCIFORMES	CICHLIDES	Hemichromis bimaculatus	
		Tylochromis jentinki	
		Tilapia galilea	
		Tilapia nilotica	
	Tilapia melanopleura		
	Ctenopoma kingsleyae		
	OPIHIOCEPHALIDES	Parophiocephalus obscurus	
	ELEOTRIDES	Kribia nana	
POLYPTERIFORMES	POLYPTERIDES	Polypterus senegalus	
		Polypterus bichir	
CERATODIFORMES	LEPIDOSIRENIDES	Protopterus annectens	

Source : Le Niokolo - koba, Premier Grand Parc National de la République du Sénégal, sous la direction de A.R. DUPUY, 1971.

2. LES AMPHIBIENS

ORDRE	FAMILLE	ESPECES
ANOURES	BUFONIDES (CRAPAUDS)	<i>Bufo regularis</i>
	RANIDES (GRENOUILLES)	<i>Ptychadena longirostris</i>
		<i>Ptychadena oxyrhynchus</i>
		<i>Ptychadena macCarthyensis</i>
		<i>Ptychadana mascareniensis pumilio</i>
		<i>Ptychadena superciliaris</i>
		<i>Ptychadena tournieri</i>
		<i>Ptychadena trinodis</i>
		<i>Abrana floweri</i>
		<i>Rana galamensis</i>
		<i>Dicroglossus occipitalis</i>
		<i>Phrynobatrachus calcaratus</i>
		<i>Phrynobatrachus accraensis</i>
		<i>Phrynobatrachus fransisci</i>
		<i>Hemisis marmoratus</i>
	<i>Afrizalus weidholzi</i>	
	RHACOPHORIDES (RAINETTES)	<i>Afrizalus fulvovittatus</i>
	<i>Hyperolius nitidulus</i>	
	<i>Hyperolius lamottei</i>	
	<i>Leptopetis viridis</i>	

Source : Le Niokolo - koba, Premier Grand Parc National de la République du Sénégal, sous la direction de A.R. DUPUY, 1971.

3. LES REPTILES

ORDRE	FAMILLE	ESPECES
SAURIENS	GEKKONIDES	<i>Hemidactylus brooki angularis</i>
		<i>Tarentola annularis</i>
		<i>Hemiteconyx caudicinctus</i>
	AGAMIDES	<i>Agama agama savatieri</i>
	VARANIDES	<i>Varanus niloticus niloticus</i>
	SCINCIDES	<i>Mabuya perroteti</i>
OPHIDIENS (SERPENTS)	CHAMAELEONIDES	<i>Chamaelo senegalensis senegalensis</i>
	TYPHLOPIDES	<i>Typhlops punctatus</i>
	LEPTOTYPHLOPS	<i>Leptotyphlops koniagui</i>
	BOIDES	<i>Leptotyphlops macrorhynchus</i>
		<i>Python sebae</i>
	COLUBRIDES	<i>Boaedon fuliginosus</i>
		<i>Boaedon lineatus lineatus</i>
		<i>Lycophidium semicinctum</i>
		<i>Philotamnus irregularis irregularis</i>
		<i>Meizodon coronatus</i>
		<i>Prosymna meleagris</i>
		<i>Gravia smythi</i>
		<i>Crotaphopeltis hotambeia</i>
		<i>Ramphiphis oxyrhynchus</i>
		<i>Psammophis elegans</i>
		<i>Psammophis elegans</i>
		<i>Psammophis sibilans sibilans</i>
		<i>Dispholidus typus</i>
		<i>Naja nigricolis</i>
	<i>Naja haje haje</i>	
	VIPERIDES	<i>Bitis arietans arietans</i>
		<i>Echis carinatus</i>
		<i>Causus rhombeatus</i>
		<i>Atractaspis dahomeyensis</i>
	TESTUDINIDES	<i>Kinixys belliana</i>
	PELOMEDUSIDES	<i>Pelomedusa subrufa olivacea</i>
		<i>Pelosios subniger</i>
TRIONYCHIDES	<i>Cyclanorbis senegalensis</i>	
CROCODYLIENS (CROCODYLES)	CROCODYLIDES	<i>Crocodylus niloticus</i>
		<i>Crocodylus cataphractus</i>
		<i>Osteolaemus tetraspis</i>

Source : Le Niokolo - koba, Premier Grand Parc National de la République du Sénégal, sous la direction de A.R. DUPUY, 1971.

4. LES OISEAUX

ORDRE	FAMILLE	ESPECES	
		NOMS COMMUNS	NOMS SCIENTIFIQUES
PELECANIFORMES	PHALACROCORACIDE	Anhinga	Anhinga rufa
		Petit cormoran à longue queue	Phalacrocorax africanus
ARDEIFORMES	PELECANIDES	Grand cormoran	Phalacrocorax carbo
		Pélican blanc	Pelecanus onocrotalus
	Pélican gris	Pelecanus rufescens	
	PLATALEIDES	Spatule blanche d'Afrique	Platalea alba
	THRESKIOMITHIDES	Ibis hagedash	Hagedashia hagedash
		Ibis falcinelle	Plegadis falcinellus
	ARDEIDES	Ibis sacré	Threskiornis aethiopicus
		Héron cendré	Ardea cinerea
		Héron goliath	Ardea goliath
		Héron à tête noire	Ardea melanocephala
		Héron pourpré	Ardea purpurea
		Blongios de Stürm	Ardeirallus sturmi
		Héron crabier	Ardeola ralloides
		Héron garde-boeuf	Bubulcus ibis
		Héron à dos vert	Butorides striatus
		Grande aigrette	Egretta alba
		Aigrette garzette	Egretta garzetta
		Aigrette à gorge blanche	Egretta gularis
		Aigrette à bec jaune	Egretta intermedia
		Héron Blongios	Ixobrychus minutus
Héron ardoisé		Melanophox nycticorax	
Héron bihoreau		Nycticorax nycticorax	
SCOLIDES	Ombrette	Scopus umbretta	
CICONIDES	Cigogne blanche	Ciconia ciconia	
	Cigogne épiscopale	Dissoura episcopa	
	Jabiru	Ephippiorhynchus senegalensis	
	Tantale	Ibis ibis	
	Marabout	Leptoptilos crumeniferus	
ANSERIFORMES	ANATIDES	Cigogne d'Abdim	Sphenorhynchus abdimi
		Sarcelle marbrée	Anas angustirostris
		Sarcelle d'été	Anas querquedula
		Canard pilet	Anas acuta
		Dendrocygne fauve	Dendrocygna fulva
		Dendrocygne veuf	Dendrocygna viduata
		Oie d'Egypte	Alopochen aegyptica
		Oie naine	Nettapus auritus
		Oie de Gambie	Plectropterus gambensis
		Canard casqué	Sarkidiornis melanotos
		Canard souchet	Spatula clypeata
		LARIFORMES	STERNIDES
RHYNCHOPIDES	Bec-en-ciseaux		Rhynchops flavirostris
CHARADRIIFORME	GLAREOLIDES	Glaréole	Glareola pratincola
	CURSORIIDES	Courvite de Temminck	Cursorius temmincki
		Couvite Isabelle	Cursorius cursor
	CHARADRIIDES	Pluvier d'Egypte	Pluvianus aegyptus
		Pluvier du Sénégal	Afribyx senegalus
		Petit gravelot	Charadrius dubius
		Pluvier à petit collier de Forbes	Charadrius forbesi
		Grand gravelot	Charadrius hiaticula
		Vanneau armé	Hoplopterus spinosus
		Vanneau à tête noire	Sarciophorus tectus
		Pluvier à tête blanche	Xiphidiopterus albiceps
	Pluvier lugubre	Stephanibyx lugubris	
	RECURVIROSTRIDES	Echasse blanche	Himantopus himantopus
	SCOLOPACIDES	Avocette	Recurvirostra avocetta
Chevalier guignette		Tringa hypoleucos	
Bécassine commune		Capelle gallinago	
Barge à queue noire		Limosa limosa	
Chevalier arlequin		Tringa erythropus	
Chevalier sylvain		Tringa glareola	
Chevalier aboyeur		Tringa nebularia	
Chevalier cui-blanc		Tringa ochropus	
Chevalier stagnatile		Tringa stagnitilis	
Chevalier gambette		Tringa totanus	
ROSTRATULINIDES	Bécassine peinte	Rostratula benghalensis	

	JACANIDES	Jacana	Actophilornis africanus		
GRUIFORMES	BURHINIDES	Oedicnème du Cap	Oedicnemus capensis		
		Oedicnème criard ou d'Europe	Oedicnemus oedicnemus		
		Oedicnème du Sénégal	Oedicnemus senegalensis		
		Oedicnème à pattes vertes	Oedicnemus vermiculatus		
	OTIDIDES	Outarde à ventre noire	Lissotis melanogaster		
		Grande outarde de Denham	Neotis cafra denhami		
		Grue couronnée	Balearica pavonina		
		Petite poule d'eau africaine	Gallinula angulata		
		Marouette noire	Limnocorax flavirostris		
		Grébifoulque	Podica senegalensis		
GALLIFORMES	NUMIDIDES	Pintade commune	Numida meleagris		
	PHASIANIDES	Caille d'Europe	Coturnix coturnix		
		Francolin à gorge blanche	Francolinus albogularis		
		Francolin à double éperon	Francolinus bicalcaratus		
		Poule des rochers	Ptilopachus petrosus		
COLUMBIFORMES	PTEROCLIDIDES	Ganga à ventre châtin	Pterocles exustus		
	COLUMBIDES	Ganaga à quadruple collier	Pterocles quadricinctus		
		Pigeon de Guinée	Columba guinea		
		Tourterelle rieuse	Streptopelia roseagrisca		
		Tourterelle du Cap	Oena capensis		
		Tourterelle maillée	Stigmatopelia senegalensis		
		Tourterelle pleureuse	Streptopelia decipiens		
		Tourterelle à collier	Streptopelia semitorquata		
		Tourterelle de l'Adamaoua	Streptopelia hippopyrrha		
		Tourterelle des bois	Streptopelia turtur		
		Tourterelle vineuse	Streptopelia vinacea		
		Emerauldine à bec noir	Turtur abyssinica delicatula		
		Tourterelle d'Afrique	Turtur afer		
		Pigeon vert à front nu	Vinago australis		
		Pigeon à épaulettes violettes	Vinago waalia		
		FALCONIFORMES	SAGITARIIDES	Grand serpentaire	Sagittarius serpentarius
			FALCONIDES	Vautour palmiste	Gypohierax angolensis
				Vautour de Rüppel	Gyps ruepelli
				Charognard	Necrosyrtes monachus
Vautour d'Egypte	Neophron percnopterus				
Vautour africain	Torgos tracheliotus				
Vautour Oricou	Torgos tracheliotus nubicus				
Vautour à tête blanche	Trigonoceps occipitalis				
Naucier d'Afrique	Chelictinia riocourti				
Elanion blanc	Elanus caeruleus caeruleus				
Faucon des chauves-souris	Machaerampus alcinus				
Bondrée apivore	Pernis apivorus				
Milan noir	Milvus migrans				
Autour ou Epervier Shikra	Accipiter badius sphenurus				
Epervier de l'Ovampo	Accipiter ovampensis				
Autour gabar	Melierax gabar				
Autour chanteur	Melierax meabates metabates				
Busard des sauterelles	Butastur rufigennis				
Buse à queue rousse	Buteo agurialis				
Aigle pêcheur	Haliaeetus vocifer clamans				
Buse unibande	Kaupifalco monogrammicus				
Aigle ravisseur	Aquila rapax raptor				
Aigle de Wahlberg	Aquila wahlbergi				
Aigle fascié	Hieraetus spilogaster				
Aigle hupé	Lophaeetus occipitalis				
Aigle belliqueux	Polemaetus bellicosus				
Busard des roseaux	Circus aeruginosus				
Busard pâle	Circus macrourus				
Busard cendré	Circus pygargus				
Petit serpentaire	Gymnogenys typicus pectoralis				
Circaète de Baudouin	Circaetus baudouini				
Circaète cendré	Circaetus cunerascens				
Circaète brun	Circaetus cinereus				
Circaète gaulois	Circaetus gallicus				
Aigle bateleur	Terathopius ecaudatus				
Faucon-coucou	Aviceda cuculoides				
Faucon bihoreau	Falco subbuteo				
Faucon à cou roux	Falco chicquira				
Faucon de barbarie	falco				
Faucon-renard	Falco alopex				
Faucon-ardoisé	Falco ardosiceus				

		Petit martin pêcheur huppé	<i>Corythornis cristata cristata</i>	
		Martin-chasseur strié	<i>Halcyon chelicuti chelicuti</i>	
		Martin-chasseur à tête grise	<i>Halcyon leucocephala</i>	
		Martin-chasseur à poitrine bleue	<i>Halcyon malimbicus torquatus</i>	
		Martin chasseur du Sénégal	<i>Halcyon senegalensis senegalensis</i>	
		Martin-chasseur pygmée	<i>Ispidina picta picta</i>	
		Martin-pêcheur géant	<i>Megaceryle maxima maxima</i>	
	BUCEROTIDES	Grand calao d'Abyssinie	<i>Bucorvus abyssinicus</i>	
		Petit calao à bec rouge	<i>Tockus erythrorhynchus erythr.</i>	
		Petit calao à bec noir	<i>Tockus nasutus nasutus</i>	
		Moqueur commun	<i>Phoeniculus purpureus senegalensis</i>	
		Petit moqueur noir	<i>Scoptelus aterrimus aterrimus</i>	
		Huppe d'Europe	<i>Upupa epops</i>	
PASSERIFORMES	MUSCICAPIDES	Gobe-mouches soyeux du Sénégal	<i>Batis senegalensis</i>	
		Gobe-mouches bleu à longue queue	<i>Erranomis longicauda longicauda</i>	
		Gobe-mouche des marais	<i>Muscicapa aquatica</i>	
		Gobe-mouche pâle	<i>Bradornis pallidus</i>	
		Gobe-mouche des marais	<i>Muscicapa aquatica</i>	
		Gobe-mouche pâle	<i>Bradornis pallidus</i>	
		Gobe-mouches noir	<i>Ficedula hypoleucos</i>	
		Gobe-mouches à ventre jaune	<i>Hilota flavigaster flavigaster</i>	
		Gobe-mouches Drongo	<i>Parisoma edolioides</i>	
		Gobe-mouches Mésange	<i>Parisoma plumbeum</i>	
		Gobe-mouches car. à collier	<i>Platysteira cyanea cyanea</i>	
		Moucherolle à tête noire	<i>Tchitreia nigriceps nigriceps</i>	
		Moucherolle de paradis	<i>Tchitreia viridis viridis</i>	
			SYLVIIDES	Rousserolle effarvate
		Agrobate rubigineux		<i>Agrobates galactotes</i>
		Camaroptère à dos gris		<i>Camaroptera brevicauda</i>
		Camaroptère à dos vert		<i>Camaroptera chloronata ssp</i>
		Cisticole à ailes courtes		<i>Cisticola brachyptera brachyptera</i>
		Cisticole chanteuse		<i>Cisticola cantans swanzii</i>
		Cisticole à face rousse		<i>Cisticola erythropus erythropus</i>
		Cisticole roussâtre		<i>Cisticola galactotes</i>
		Cisticole commune		<i>Cisticola juncidis uropygialis</i>
		Cisticole siffleuse		<i>Cisticola lateralis lateralis</i>
		Cisticole striée		<i>Cisticola natalensis strangei</i>
		Cisticole rousse		<i>Cisticola rufa</i>
		Eremomèle à dos vert		<i>Eremomela pusilla pusilla</i>
		Fauvette à ailes rousses		<i>Heliois erythroptera</i>
		Fauvette-Roitelet à moustaches		<i>Herpystera superciliosa subflava</i>
		Hippolais-pâle		<i>Hippolais pallida</i>
		Hippolais polyglotte		<i>Hippolais polyglotta</i>
		Locustelle luscinoïde		<i>Locustella luscinoïdes</i>
		Grande fauvette à moustaches		<i>Melocichla mentalis mentalis</i>
		Pouillot véloce		<i>Phylloscopus collybita</i>
		Pouillot Fitis		<i>Phylloscopus trochilus trochilus</i>
		Fauvette grise		<i>Sylvia communis communis</i>
		Fauvette crombec		<i>Sylvietta brachyura brachyura</i>
		TURDIDES	Grande Cossyphie à tête blanche	<i>Cossypha albicapilla albicapilla</i>
			Petite Cossyphie à tête blanche	<i>Cossypha niveicapilla niveicapilla</i>
			Merle podobé	<i>Cercotrichas podobe</i>
			Gorge-bleue	<i>Luscinia svecica</i>
			Merle podobé	<i>Cercotrichas podobe</i>
			Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>
			Traquet noir à front blanc	<i>Pentholea albifrons frontalis</i>
			Rouge-queue de muraille	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
		TIMALIDES	Grive kurrichane	<i>Turdus libonyanus chiguancoïdes</i>
			Timalie noir	<i>Hypergerus atriceps</i>
		PICNONOTIDES	Cratérope brun	<i>Turdoides plebeja platycircus</i>
	Cratérope à tête noire		<i>Turdoides reinwardi reinwardi</i>	
	CAMPEPHAGIDES	Bulbul commun	<i>Pycnonotus barbatus inornatus</i>	
		Grand bulbul à gorge jaune	<i>Pyrhurus flavicollis flavicollis</i>	
	LANIIDES	Echenilleur à épaulettes rouges	<i>Campephaga phoenicea</i>	
		Drongo brillant	<i>Dicrurus adsimilis adsimilis</i>	
		Corvinelle	<i>Corvinella corvina corvina</i>	
		Pie-Grièche Cubla	<i>Dryoscopus gambensis gambensis</i>	
		Gonoleck de Barbarie	<i>Laniarius barbarus</i>	
		Pie-Grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	
		Pie-grièche soufrée	<i>Malaconotus sulfurepectus</i>	
		Pie-grièche soufré	<i>Malaconotus sulfurepectus</i>	

		Pie-grièche de Blanchot	Malconotus blanchoti	
		Pie-Grièche à tête rousse	Lanius senator	
		Pie-Grièche verte à tête grise	Malconotus poliocephalus	
		Pie-Grièche Brubru	Nilaus afer afer	
		Grande Tchagra à tête noire	Tchagra senegala	
	PRIONOPIDES	Bagadais casqué	Prionops plumata	
	PARIDES	Mésange noire à ép. blanches	Parus niger guineensis	
	HIRUNDINIDES	Hirondelle de fenêtre	Delichon urbica	
		Hirondelle à gorge striée	Hirundo abyssinica puella	
		Hirondelle à gorge blanche	Hirundo aethiopica	
		Hirondelle rousseline	Hirundo daurica	
		Hirondelle à ventre roux	Hirundo senegalensis	
		Hirondelle à gorge rousse	Hirundo lucida	
		Hirondelle de cheminée	Hirundo rustica rustica	
		Grande hirondelle ventre roux	Hirundo senegalensis	
		Petite hirondelle à ventre roux	Hirundo semirufa gordini	
		Hirondelle à longs brins	Hirundo smithi smithi	
		Hirondelle hérissée	Psilidoprocne obscura	
		Hirondelle de rivage	Riparia riparia riparia	
		CERTHIIDES	Grimpère tacheté	Salpornis spiloneta
		NECTARINIIDES	Souï-manga de Longue-mare	Anthreptes longuemarei
	Souï-manga olivâtre		Nectarina olivacea	
	Souï-manga à ventre jaune		Nectarina venusta	
	Souï-manga à ventre olive		Nectarina chloropigia	
	Souï-manga cuivré		Nectarina cuprea	
	Souï-manga à poitrine rouge		Chalcomitra senegalensis	
	Souï-manga olivâtre		Nectarina olivacea	
	Souï-manga à ventre jaune		Nectarina venusta	
	Souï-manga à ventre olive		Nectarina chloropigia	
	Souï-manga cuivré		Nectarina cuprea	
	Souï-manga olive à tête brune		Cyanomitra verticalis	
	Souï-manga pygmée à l. queue		Hedydipna platyura	
	Souï-manga à longue queue		Nectarinia pulchella pulchella	
	ZOSTEROPIDES		Oiseau-lunettes jaune	Zosterops senegalensis
	FRINGILIDES	Bruant à ventre jaune	Emberiza forbesi nigeriae	
		Bruant cannelle	Fringillaria tahapisi	
		Petit moineau Soulcie	Gymnoris dentala	
		Moineau africain	Passer griseus griseus	
		Serin à front jaune	Serinus mozambicus caniceps	
	PLOCEIDES	Spermette-pie	Amauresthes fringilloides	
		Alecto à bec blanc	Bubalornis albirostris albirostris	
		Veuve à dos doré	Coliuspasser macrourus	
		Cordon bleu	Estrilda bengala	
		Amarante masqué	Estrilda larvata	
		Tisserin à ailes rouges	Malimbicus ruficeps	
		Travailleur à bec rouge	Quelea erythropis	
		Gros-bec ponceau à ventre noir	Piesnestes sanguinea	
		Cou-coupé	Amadina fasciata	
		Diamant aurore	Pytha phoenicoptera	
		Combassou du Sénégal	Vidua chalybeata	
		Combassou noir	Vidua wilsoni	
		Spermette nonette	Conchura cucullata	
		Oucue-de-vinaigre	Estrilda caeruleascens	
		Bec de corail	Estrilda astrild	
		Joues-oranges	Estrilda melpoda melpoda	
		Monseigneur	Euplectes hordacea	
		Ignicole	Euplectes orix franciscana	
		Tisserin à lunettes	Hyphanturgus brachypterus	
		Sénégal gris-bleu	Lagonosticta coerulescens	
		Sénégal à poitrine barrée	Lagonosticta rufopicta	
		Sénégal à ventre noir	Lagonosticta rara	
		Sénégal amarante	Lagonosticta senegal senegala	
		Sénégal vineux	Lagonosticta vinacca	
		Gendarme	Plesiositagra cucullata	
		Tisserin vitellin	Plesiositagra cucullata	
		Moineau tisserin	Plocepasser superciliosus	
		Pytilie à ailes rouges	Pytilia phoenicoptera	
		Tisserin à tête noire du Niger	Sitagra capitalis	
		Tisserin minulle	Sitagra luteola luteola	
		Tisserin nain	Sitagra monacha	
		Spermette à capuchon	Spermestes cucullatus cucullatus	
		Veuve à collier d'or	Steganura orientalis aucupus	

		Cordon bleu Mariposa	Uraeginthus bengalus
		Veuve dominicaine	Vidua macroura
	ALAUDIDES	Alouette modeste	Helicocorys modesta nigrita
	MOTACILLIDES	Pipit rousseline	Anthus campestris
		Pipit à gorge rousse	Anthus cervinus
		Pipit à dos roux	Anthus leucophrys zenkeri
		Pipit des arbres	Anthus trivialis
		Bergeronnette pie	Motacilla alba viduata
		Bergeronnette jaune	Motacilla flava
	STUMIDES	Bergeronnette grise	Motacilla alba alba
		Pique-beouf à bec jaune	Buphagus africanus
		Echenilleur à épaulettes	Campephaga phoenicea
		Etourneau améthyste	Cinnyricinclus leucogaster
		Merle métallique à q. violette	Lamprocolius chalcurus chalcurus
		Merle métallique à or. bleus	Lamprocolius chalybaeus
		Merle métallique de Swainson	Lamprocolius chloropterus
	ORIOLOIDES	Merle pourpré	Lamprocolius purpureus
		Merle métallique à longue queue	Lamprotornis caudatus
		Loriot jaune d'Afrique	Oriolus auratus auratus
	CORVIDES	Corbeau-pie	Corvus albus
		Piac-piac	Phlostomus afer

Liste partiellement actualisée en juin 2000

5. LES MAMMIFERES

ORDRE	FAMILLE	ESPECES	
		NOMS COMMUNS	NOMS SCIENTIFIQUES
INSECTIVORES	SORICIDES (MUSARAIGNES)		Crocidura lamottei
			Crocidura bicolor
CHIROPTERES	PTEROPIDES (ROUSSETTES)	Epomophore de Gambie	Epomophorus gambianus
		Epomophore nain	Epomophorus pusillus
	NYCTERIDES (NYCTERES)	Nyctère de Gambie	Nycteris gambiensis
			Nycteris hispida
	RHINOLOPHIDES		Rhinolophus alcyone
	HIPPOSIDERIDES (PHYLLORHINES)	Phyllorhine de Gambie	Hipposideros commersoni gambiensis
		Phyllorhine de Guinée	Hipposideros caffer guineensis
	VESPERTILIONIDES (VESPERTILIONS)		Hipposideros tephros
			Eptesicus guineensis
			Eptesicus minutus
			Eptesicus rendalli
			Scotophilus leucogaster leucogaster
		Scotophilus nigrita nigrita	
MOLOSSIDES (MOLOSSES)		Tadarida condylura wonderi	
		Tadarida limbata websteri	
PRIMATES	LORISIDES	Galago du Sénégal	Galago senegalensis
	COLOBIDES	Colobe bai	Colobus badius
	CERCOPITHECIDES	callitriche	Cercopithecus aethiops sabeus
		Singe rouge	Erythrocebus patas patas
	Cynocéphale	Papio papio	
ANTHROPOIDES	Chimpanzé	Pan troglodytes verus	
PHOLIDOTES	MANIDES	Pangolin géant	Smutsia gigantea
	LEPORIDES	Lièvre	Lepus crawshayi
RONGEURS ET LAGOMORPHE	ECHIMYIDES	Aulacode	Thryonomys swinderianus
	HYSTRICIDES	Porc-épic du Sénégal	Hystrix cristata senegalica
	SCIURIDES	Ecureuil de Gambie	Heliosciurus gambianus
		Ecureuil fouisseur	Xerus erythropus erythropus
	MUSCARDINIDES	Graphiure de Spurrell	Claviglis spurrelli
	MURIDES	Rat roussard	Arvicanthis niloticus
		Rat-souris	Rattus daltoni
Gerbille de Guinée		Tatera guineae guineae	
CARNIVORES	CANIDES	Chacal à flancs rayés	Canis adustus
		Cinhyène	Lycaon pictus
	MELLIDES	Ratel	Mellivora capensis
	MUSTELIDES	Loutre à joues blanches	Aonyx capensis capensis
		Civet	Viverra civetta
		Genette commune	Genetta genetta
		Genette pardine	Genetta maculata
		Pseudogenette	Pseudogenetta villiersi
		Nandinie	Nandinia binotata binotata
		VIVERRIDES	Mangouste Ichneumon

		Mangouste rouge	<i>Herpestes sanguineus</i>
		Mangouste à q. blanche	<i>Ichneumia albicauda</i>
		Mangue ravée	<i>Mungos mungo</i>
		Mangue de Gambie	<i>Mungos gambianus</i>
	HYENIDES	Hyène tachetée	<i>Crocuta crocuta</i>
	FELIDES	Chat ganté	<i>Felis lybica</i>
		Serval	<i>Felis serval</i>
		Caracal	<i>Felis caracal</i>
		Panthère	<i>Panthera pardus</i>
		Lion	<i>Leo leo</i>
TUBULIDENTES	ORYCTEROPIDES	Oryctérope	<i>Orycteropus afer</i>
PROBOSCIDIENS	ELEPHANTIDES	Eléphant d'Afrique	<i>Loxodonta africana</i>
HYRACOIDES	PROCAVIDES	Daman de rochers	<i>Procavia rufigeops</i>
ARTIODACTYLE	SUIDES	Phacochère	<i>Phacochoerus aethiopicus</i>
		Potamochère	<i>Potamochoerus porcus porcus</i>
	HIPPOPOTAMIDES	Hippopotame	<i>Hippopotamus amphibius</i>
	BOVIDES	Guib harnaché	<i>Tragelaphus scriptus</i>
		Eland de Derby	<i>Taurotragus derbianus derbianus</i>
		Buffle	<i>Syncerus caffer nanus</i>
		Céphalophe à flancs roux	<i>Cephalophus rufilatus</i>
		Sylvicapre de Grimm	<i>Sylvicapra grimmia</i>
		Cobe defassa	<i>Kobus defassa</i>
		Cobe de Buffon	<i>Kobus kob</i>
		Cobe de roseaux	<i>Redunca redunca</i>
		Hippotrague	<i>Hippotragus equinus</i>
		Bubale	<i>Alcelaphus buselaphus major</i>
	Ourébi	<i>Ourebia ourebi</i>	

Liste partiellement actualisée en juin 2000

ANNEXE III

LISTE DES PRINCIPAUX INTERVENANTS DANS LE PARC ET SUR SA ZONE PERIPHERIQUE

1. PROJET DE GESTION COMMUNAUTAIRE DES RESSOURCES NATURELLES (PGCRN)

LOCALISATION : Parc de Hann, BP 1831- Dakar

OBJECTIFS : contribuer à l'augmentation des revenus du secteur privé rural à partir d'une exploitation durable des ressources naturelles et grâce à une gestion décentralisée et participative devant aboutir à terme à une amélioration de la productivité des sols.

DUREE : 7 ans (octobre 94 à octobre 2001)

ZONE D'INTERVENTION : 20 CR : Fatick : 4, Kaolack : 3, Kolda : 6, Tambacounda : 7

AGENCE D'EXECUTION : Ministère de l'Environnement en collaboration avec le Consortium du Sud Ouest pour le Développement International (SECID).

BAILLEURS DE FONDS : USAID

DEMARCHE

1/ Mise en place de Comités de Gestion des Ressources Naturelles (CGRN)

Organe du conseil rural, il est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un plan d'aménagement et de gestion des terroirs (PAGT). Il s'agit d'un cadre de référence stratégique pour orienter leurs efforts dans la résolution des problèmes les plus cruciaux de gestion des ressources naturelles identifiés au niveau local. Il doit également développer une stratégie de communication et assurer la gestion administrative et financière des activités du projet au niveau local.

2/ Elaboration d'un diagnostic de territoire selon 4 étapes :

- Revues de données de la communauté rurale ;
- Formation théorique et pratique des membres du CGRN à la MARP ;
- Réalisation du diagnostic par les membres du CGRN sous la supervision du cabinet INGSAMEC et du CER ;
- Elaboration du PAGT par les membres du CGRN, les experts du cabinet et le service du CER.

3/ Mise en place de fonds

Des fonds sont mis à la disposition des CGRN pour assurer leur fonctionnement et le financement des activités planifiées.

REALISATIONS : Les activités portent pour l'essentiel sur l'appui technique et financier aux populations et aux organisations de base pour l'adoption de technologies améliorées de gestion des ressources naturelles.

2. FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL (FDL)

LOCALISATION : Kédougou

OBJECTIFS : Lutter contre la pauvreté par la valorisation des espaces productifs à travers une gestion communautaire des ressources et appuyer la décentralisation par l'ancrage de l'institution Communauté rurale et Commune en temps que structure de la vie économique des populations.

DUREE : 6 ans (1999-2004)

ZONE D'INTERVENTION : Départements de Kedougou et de Tambacounda

BAILLEURS DE FONDS : PNUD-FENU :

DEMARCHE

1/ Réalisation d'un diagnostic

Approche participative avec comme principales cibles les organisations de base dans les villages, le Conseil rural et le CER (MARP) complétée par une revue documentaire auprès des services techniques départementaux, des Sociétés de développement et d'autres organismes locaux et nationaux :

2/ Elaboration de documents de planification : les plans de développement locaux

Ils comprennent les potentialités des communautés rurales du point de vue ressources naturelles, humaines, économiques, les contraintes et les propositions de solutions données par les populations.

3/ Mise en place de structures

Au niveau institutionnel, deux structures seront mises en place :

- le cadre de concertation et de coordination qui est une structure de concertation, de coordination, de décision et de programmation des actions et programmes à réaliser dans les PLD des CR d'un même arrondissement ;
- le comité de développement communautaire, structure de coordination inter zonale. Chaque zone est pilotée par une association villageoise de développement (AVD) qui sera chargée d'appuyer le conseil rural dans le management des activités de développement retenues dans le PLD.

REALISATIONS :

- Réalisation des plans de développement locaux pour chaque communauté rurale
- Elaboration d'un programme d'actions concernant la communauté rurale et les infrastructures
- Mise en place d'un comité de suivi dans l'arrondissement de Missirah

3. PROGRAMME SPECIAL POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE (PSSA)

LOCALISATION : Kédougou

OBJECTIFS : Assurer la sécurité alimentaire des villageois par le développement de la culture du riz et d'activités annexes (apiculture, pisciculture...)

DUREE : 2 ans (1997-mars 99)

BAILLEURS DE FONDS : FAO

ZONE D'INTERVENTION : Département de Kédougou

DEMARCHE : Apport d'un appui technique et financier.

REALISATIONS

- Réalisation de 5 sites rizicoles : Kédougou, Bouroucoundi et Ibel, Samécouta, Poundala et Saraya ;
- Fabrication de ruches à base de palmier ou de béton armé, transfert de technique de stérilisation du miel ;
- Aménagement d'une mare pour développer la pisciculture ;
- Projet élevage (métissage avec coq amélioré) à Mako dans le cadre du programme Telefood
- Projet maraîchage à Tabatekenda dans le cadre du programme Telefood

4. GROUPEMENT AFRICAIN DES VOLONTAIRES DU DEVELOPPEMENT (GAVD)

LOCALISATION : Kédougou

OBJECTIFS : Promotion du développement rural et encadrement des organisations socio-économiques

ZONE D'INTERVENTION : Département de Kédougou

REALISATIONS

- Aide à la constitution d'associations villageoises de développement communautaire (AVDC).
- Action de formation en alphabétisation, en auto promotion et en gestion des AVDC
- Actions de conception de projets sur l'environnement (cascade de Dindefello)
- Actions sur la prévention du SIDA

5. PROJET DE PROMOTION DES MICRO ENTREPRISES RURALES (PROMER)

LOCALISATION : Tambacounda, quartier liberté (face Eaux et Forêts)

OBJECTIFS : Améliorer les revenus des familles rurales pauvres par la création de nouveaux emplois saisonniers ou permanents rémunérateurs et durables.

- Produire de façon significative des biens et services de qualité nécessaires au développement économiques des zones rurales, à travers notamment la valorisation des productions agricoles locales.
- Allonger la période de travail au - delà des périodes de travaux agricoles.
- Réduire l'exode rural grâce à des opportunités de travail offertes aux jeunes dans leurs villages.

ZONE D'INTERVENTION : Région de Tambacounda et de Kolda pour les 4 premières années, Régions de Fatick et Kaolack pour les deux dernières.

BAILLEURS DE FONDS : Prêts FIDA à hauteur de 67 %, Bénéficiaires : 12,1 %, Gouvernement du Sénégal : 10,6 %, CMS : 10,3 %

DUREE : 6 ans (a débuté en juin 97)

DEMARCHE :

1/ Réalisation d'un diagnostic pour connaître les filières hors agriculture et les savoir-faire pour la première phase, et approfondissement des connaissances sur les filières et définition des axes d'intervention

Ce diagnostic a abouti à l'élaboration d'un document d'orientation général du projet.

2/ Mise en œuvre de l'appui aux porteurs de projets par une campagne d'information sensibilisation au sein des villages et auprès des autorités et des organismes partenaires.

REALISATIONS : Campagne d'information, Mise en place de permanence dans les loumas, Appui conseil aux porteurs d'initiatives (16 dossiers sont en montage financier sur la communauté rurale de Dialakoto), Formation

BUDGET : 6 milliards de F CFA

6. PROGRAMME POUR LA GESTION DURABLE ET PARTICIPATIVE DES ENERGIES TRADITIONNELLES ET DE SUBSTITUTION (PROGEDE)

LOCALISATION : Dakar, tel : 832-47-38, fax : 832-47-39, Tamba, 981-23-24, Kolda

OBJECTIFS : Contribuer à l'approvisionnement des ménages en combustibles domestiques, de manière régulière et durable, en préservant l'environnement, en offrant des possibilités élargies de choix et de confort aux consommateurs.

ZONE D'INTERVENTION : Départements de Tambacounda et de Kolda

DUREE : 7 ans (a débuté en 1997)

BAILLEURS DE FONDS : Banque mondiale

REALISATIONS

- atelier de planification des activités du projet en matière de gestion de la biodiversité dans la périphérie du parc national du Niokolo Koba
- une MARP sur la diversité biologique dans deux villages périphériques du Parc national du Niokolo Koba
- diagnostics socio-économiques des villages riverains de la forêt communautaire de Thiéwal
- étude des productions horticoles dans les zones forestières des régions de Tambacounda et de Kolda : contraintes et perspectives de développement etc

BUDGET : 19 933 958 US\$

7. GROUPE D'APPUI AU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (GADEC)

LOCALISATION : Tambacounda

ZONE D'INTERVENTION : Département de Tambacounda et un peu de Bakel

DUREE : a débuté en 1987

BAILLEURS DE FONDS : Union Européenne, Terres Nouvelles (Belgique), NCOS (ONG Belge), VECO (Belge), Belance (Hollande), Luthériens (USA), Oxfam America, IRD, Fondation Rurale pour l'Af. de l'Ouest

DEMARCHE

- Réalisation d'un diagnostic sur les opportunités et contraintes du terroir avec des outils participatifs.
- Mise en œuvre d'un plan d'actions où les villageois sont les acteurs et les services techniques, les ONG, les projets les intervenants.

DOMAINES D'INTERVENTION

Le programme s'articule autour de 10 axes :

- Animation interne, formation de relais techniques paysans et éducation à la citoyenneté
- Renforcement des organisations paysannes : mode de prise de décision démocratique, dynamique associative
- Valorisation des vallées : implantation de micro barrages
- Diversification des sources de revenus, circulation des productions : traitement des ravines, approvisionnement en semences sélectionnées, circuit de commercialisation
- Gestion des espaces partagés (forêts, rivières), mis en défens autour des vallées, recherche-développement
- Développement institutionnel du GADEC, gestion des infrastructures et équipements

8. PROJET NIOKOLO BADIAR

LOCALISATION : Tambacounda, Koundara et Conakry

OBJECTIFS

- Conserver les ressources naturelles du complexe écologique Niokolo - Badiar dans le cadre de la gestion des bassins des grands fleuves soudano-sahéliens qui prennent leur source en guinée ;
- Intégrer le Parc National du Badiar et le Parc National du Niokolo Koba en vue d'aboutir à la création d'un parc régional transfrontalier et d'une réserve de la Biosphère transnationale.

ZONE D'INTERVENTION : Parc National du Niokolo Koba et du Badiar et villages périphériques

BAILLEURS DE FONDS : UE (FED)

DUREE : 1994 à 1997 (une deuxième phase débute en octobre 2000)

DEMARCHE : En zone périphérique, le projet fixe des domaines d'intervention dans les villages, et cible ensuite les villages bénéficiaires de l'intervention. Réhabilitation et soutien au fonctionnement des 2 parcs.

REALISATIONS

- Infrastructures qui lient physiquement les aires protégées (pistes, ponts, gués, bacs...)
- Mise en place d'un système de radio communication et de surveillance commune
- Coopération en matière de formation, réalisation d'un programme conjoint de recherche scientifique et de développement touristique

- En périphérie, valorisation des ressources naturelles (apiculture, exploitation durable du rônier, élevage de pintades, écotourisme) et éducation environnementale et communication.
- BUDGET** : 3,775 millions d'écus (première phase)

9. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES FIBRES TEXTILES (SODEFITEX) DIRECTION DE LA PRODUCTION COTONNIERE

LOCALISATION : Tambacounda et Kédougou

OBJECTIFS : Développement de la production de coton et encadrement des producteurs

ZONE D'INTERVENTION : Région de Tambacounda, Kolda et Kaolack

DEMARCHE

- Recensement des villageois désirant cultiver du coton, choix des terres
- Piquetage des parcelles, distribution des intrants et matériels pour ceux qui ont fait des demandes de crédits
- Travaux culturaux et protection phytosanitaire (de fin juillet à maturité), séances de formation
- Commercialisation primaire : pesée et paie, transfert des villages vers la ville par la direction industrielle

REALISATIONS

- Organisation des producteurs de coton en groupements (GPC) et formation de relais techniques production cotonnière (RTPC). Formation de gestionnaire pour gérer les magasins d'intrants et les fiches de crédits
- Action de facilitation auprès du CNCAS pour l'accès aux crédits, intrants et matériel agricole
- Encadrement des producteurs et achat de la production

10. SODEFITEX - DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RURAL

LOCALISATION : Tambacounda et Kédougou

OBJECTIFS : Promouvoir le développement rural

ZONE D'INTERVENTION : Régions de Tambacounda, Kolda et Kaolack

DUREE : Cette direction existe depuis 7 ans

DOMAINES D'INTERVENTION

- Encadrement de la culture céréalière
- Alphabétisation fonctionnelle, encadrement en élevage et santé

REALISATIONS

Dans le domaine de l'élevage :

- Appui des producteurs cotonniers en terme d'amélioration de la santé des animaux
- Promotion et développement de la production de fumure organique afin de limiter les jachères et la recherche de nouvelles terres
- Amélioration des revenus à travers des petits projets : production laitière des bovins, embouche bovine, opération tabasky, aviculture villageoise semi-industrielle pour les villages proches des villes.
- Formation de relais villageois en santé (reconnaissance des maladies, prophylaxie et conseil) et gestion de la production (embouche, réserve fourragère, dressage animaux de trait).
- Mise en place de paquets techniques : améliorer l'habitat (étable fumière), faire des réserves fourragères en fin de saison des pluies et début de saison sèche, vacciner et déparasiter, compléter l'alimentation avec des graines de coton, stabulation nocturne de janvier à mars et permanente jusqu'en juin.

Dans le domaine du conseil de gestion :

- Elaboration d'un plan de campagne, suivi du plan de campagne
- Etablissement du bilan des réalisations par rapport aux objectifs et conclusion pour la prochaine campagne

11. ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DE LA VALLEE DE LA GAMBIE (APROVAG)

LOCALISATION : Tambacounda

OBJECTIFS : Appuyer les 9 GIE de producteurs de bananes affiliés

BAILLEURS DE FONDS : ACDI (jusqu'en 1995)

ZONE D'INTERVENTION : Communautés rurales de Missirah, de Dialakoto et de Netteboulou

DUREE : Créé en 1989

REALISATIONS

- Encadrement des producteurs et formation et alphabétisation
- Appui à la commercialisation et facilitation de l'accès au crédit
- Appui à l'élaboration de projets

12. MAISON FAMILIALE RURALE (MFR)

LOCALISATION : Dialakoto et Mako

OBJECTIFS : Encadrer et assister les membres dans le cadre de l'auto promotion paysanne

ZONE D'INTERVENTION : Communautés rurales de Dialakoto et Mako

DUREE : Créée en 1978 à Mako

BAILLEURS DE FONDS : GOPEC, NOVIP, World Luthering Service, Siège de la MFR

DOMAINES D'INTERVENTION

- Encadrement des organisations paysannes
- Apiculture, arboriculture et maraîchage
- Commerce, crédit et culture attelée, alphabétisation, santé, allègement des travaux féminins

REALISATIONS

- Maraîchage le long de la Gambie : a échoué à cause des dégâts causés par les hippopotames
- Apiculture, embouche bovine
- Bananeraie : périmètres à Bafoundou et Marougokoto financé par le GOPEC pour l'achat de matériel
- Culture attelée et distribution de semences d'arachides.
- Accès au crédit sur financement de la MFR siège. Il vise à promouvoir le petit commerce pour les femmes et à développer le petit élevage et le commerce de gros bétail.
- Campagnes de chloroquinisation pour les villages adhérents
- Gestion d'une pharmacie villageoise et d'une pharmacie vétérinaire
- Gestion de deux moulins à Tomboronkoto et Niéménéké

13. SONACOS / SONAGRAINE

LOCALISATION : Tambacounda

OBJECTIFS : Développer la production d'arachide

REALISATIONS

- Approvisionnement en semences d'arachide, octroi de crédits intrants
- Commercialisation de la production d'arachides

14. PROJET D'APPUI AUX GROUPEMENTS DE PROMOTION FEMININES (PAGPF)

LOCALISATION : Missirah

OBJECTIFS : Promouvoir les groupements féminins et de jeunes à travers l'alphabétisation, l'allègement des travaux féminins, la construction de foyers, l'hydraulique et l'IEC (information-éducation- communication).

BAILLEURS DE FONDS : Le Fonds Nordique, la BAD et la Coopération belge

ZONE D'INTERVENTION : Arrondissement de Missirah

DUREE : a débuté en 1995

DOMAINE D'INTERVENTION

Agro-alimentaire (puits maraîchers et moulins), génération de revenus (banque céréalière), garderie éducative, crédits, IEC, alphabétisation fonctionnelle.

REALISATIONS

- 11 centres d'alphabétisation, subventions de 3 moulins dont les villageois assurent la gestion
- Construction d'une case foyer à Missirah et à Hamdalaye Tessan

15. FEDERATIONS DES GROUPEMENTS AUTONOMES DE PRODUCTEURS DE BANANES (FEGAP)

LOCALISATION : Tambacounda

OBJECTIFS : Renforcer les capacités de production des GIE

ZONE D'INTERVENTION : Communautés rurales de Dialakoto et de Missirah

REALISATIONS

- Rôle de facilitation pour l'accès au crédit,
- intermédiation auprès des partenaires au développement ainsi que de l'administration

16. UNION DES PRODUCTEURS DE BANANES DE TAMBACOUNDA (UPROBAT)

LOCALISATION : Tambacounda

OBJECTIFS : Renforcer les capacités de production des GIE

DUREE : Créé en 1998

REALISATIONS

- Garantie pour l'achat de matériel
- Coordination des producteurs

17. UNION REGIONALE DES COOPERATIVES AGRICOLES DE TAMBACOUNDA (URCAT)

OBJECTIFS : Apporter un appui aux coopératives agricoles de la région

ZONE D'INTERVENTION : Région de Tambacounda

REALISATIONS

- Appui aux coopérateurs pour la commercialisation de l'arachide et formations professionnelles
- Appui pour l'octroi des crédits intrants et de matériel agricole

18. PROJET FAC/FFEM DE REHABILITATION DU PARC NATIONAL DU NIOKOLO Koba ET DE SA PERIPHERIE

LOCALISATION : Dakar et Tambacounda

OBJECTIFS : Restaurer le PNNK mais également mettre en place un environnement socio-économique favorable à sa conservation *in situ* à long terme.

ZONE D'INTERVENTION : Parc national du Niokolo koba et périphérie

DUREE : 1997 - 2002

BAILLEURS DE FONDS : Fonds d'Aide et de Coopération / Fonds Français pour l'Environnement Mondial

DOMAINES D'INTERVENTION

- 1) – Appui à la réhabilitation des infrastructures du parc : réhabilitation, ouverture et entretien de pistes de circulation et d'une piste périmétrale, réfection de radiers, construction de postes de garde, de miradors
- 2) – Appui institutionnel à la DPNS : réformes institutionnelles en matière d'exploitation touristique et de gestion en périphérie, mise en place d'une structure autonome de gestion impliquant tous les acteurs.
- 3) – Appui à la mise en œuvre d'un plan de gestion : coupes d'éclaircie, aménagement des mares, création et amélioration de salines et plan de gestion des feux recherches sur la faune et les écosystèmes.
- 4) – Appui aux activités économiques des populations riveraines du PNNK. Accélérer le développement économique lié à l'existence du parc (mise en œuvre par l'AFVP).

REALISATIONS

- Piste périmétrale, postes de Médina Kouta, Bira et Baily
 - Etude de faisabilité d'une structure de gestion
 - Mise en place d'un Plan de Gestion et de suivis de la faune
 - Appui aux initiatives en périphérie (AFVP)
- BUDGET :** 900 millions de FCFA et 120 millions de contrepartie

19. PROJET RONERAIES COMMUNAUTAIRES – NIOKOLO Koba

LOCALISATION : Dakar, Tambacounda et Diénioudiala

OBJECTIFS : Préserver les forêts de rôniers du Niokolo koba et de sa périphérie par une gestion durable des peuplements en périphérie du parc et par une amélioration de la valorisation de leurs produits par les populations rurales (formations, plantations, artisanat, commercialisation adaptée, essais techniques d'exploitation...)

ZONE D'INTERVENTION : Zone périphérique du parc national du Niokolo koba

AGENCES D'EXECUTION : ONG belge « Aide au Développement – Gembloux » (ADG) et DPN

BENEFICIAIRES : populations riveraines du parc, Direction parcs nationaux et Eaux et Forêts

DUREE : 3 ans renouvelables (début 1^{er} avril 2000)

BUDGET : 700 millions de FCFA

ANNEXE IV

BIBLIOGRAPHIE GENERALE SUR LE PARC ET SA PERIPHERIE

IV.1 - LA GEOGRAPHIE HUMAINE DU NIOKOLO KOKA

- A Ouvrage consultable au Centre de Dalaba (PNNK).
 B Ouvrage consultable à l'IFAN/UCAD.
 C Ouvrage consultable au Département de Géographie (UCAD).
 D Ouvrage consultable à l'ISE (UCAD).
 E Ouvrage apparemment non disponible à Dakar.
 F Ouvrage éventuellement disponible dans une autre structure (DPNS, ORSTOM, ENS, ENEA, B.U...).
1. ADAM, J.G. (1963) A B C D F
Les plantes utiles du Parc National du Niokolo-koba (Sénégal). Comment vivre uniquement avec leurs ressources. in : Notes Africaines, N 97, pp. 5/21, 16 f.
 2. ADAM Jacques-G (1965) A B F
Tourisme et flore du Fouta-Djallon au Sénégal.
 Notes Africaines, Dakar, N 105, janv. 1965, pp. 12-15, 6 fig.
 3. ALBENQUE Alexandre (1965) E
Carte du terroir d' Etyolo, village bassari. Cah. du C.R.A., N 3, In Bull. et Mém. Soc. Anthr. Paris, XI^e Sér., t. 8, N 1-2, 1965, pp. 45-62, 6 fig., 2 Dépl. H. t.
 4. ANFREVILLE de la Salle (d') (1924) A B E F
Notre vieux Sénégal. Son histoire. Son état actuel. Ce qu'il peut devenir.
 Paris, Challamel, 1909, 299 p., cartes, photos.
 5. APSNS - APBG (1990) A F
La nature au Sénégal. Livre guide d'excursion, le PNNK, juillet 1990, pp. 51/62 Congrès de APSNS/APBG.
 6. AUBERT, A. (1923) B F
Légendes historiques et traditions orales recueillies dans la Haute Gambie.
 Bull. Comité d'Etudes historiques et scientifiques de l'AOF, pp. 384-428.
 7. BA, Cheikh. (1964) A B C F
Un type de conquête pionnière en Haute Casamance (Sénégal) : Médina Gounass. Université de Paris, Faculté des Lettres et Sciences humaines, Thèse de Doctorat de 3^{ème} Cycle de Géographie, Paris, 1964, 270 p.
 8. BAUDET, Daniel & CONDAMIN, Michel (1969) A B D F
Bibliographie générale du Parc National du Niokolo koba et de sa région.
 in : Le Parc national du Niokolo koba, fasc. III, 1969, pp. 473/487, Mémoires de l'IFAN N 84.
 9. BAYOL Dr. (1888) F
Voyage en Ségambie.
 Paris, L. Baudouin, - 24,5 cm, 230 p., 1 carte h. t. au 2.000.000^e (1882).
 10. BEART, Ch. (1947) A B F
Sur les Bassari du Cercle de la Haute Gambie (Sénégal).
 Notes Africaines, 34, avril, pp. 24-26 et 35, juill. pp. 1-6.
 11. BELAN, A. (1946) A B F
L'or dans le cercle de Kédougou (Sénégal). Notes Afric., Sénégal, N°31, pp. 9-12.
 12. BENABEN, J. (1976) F
Organisation sociale et économique des Peul Bandé.
 Mémoire de Maîtrise, Paris V, 92 p.
 13. BENOIT, Michel. (1986). C F
Les Bowébés du Kantoora. Cahiers des Sciences humaines 24(3), 1988, pp. 379-388
 14. BENOIT, Michel. (1990). A F
Genre de vie et protection de l'environnement au Sénégal. Dakar, mai 1990, 8 p.
 15. BENOIT, Michel (1990) A B F
Une philosophie pour le PNNK et sa région (Sénégal) : Réhabilitation de l'aire Protégée et écogestion de sa périphérie. Dakar, novembre 1991, 11 p.

16. BOULAND Patrick (1994) *Sous la direction de.* A F
Etude de faisabilité sur la réhabilitation du Parc National du Niokolo koba. Volet 1 : Analyse de faisabilité et proposition de gestion d'un plan global de réhabilitation. Rapport provisoire, AFID Consultance, juin 1994, 7 volets, DPNS / Mission de Coopération et d'Action Culturelle.
17. BROCARD (1907) B F
Le commerce en Gambie anglaise et en Haute-Gambie (territoire français).
 Bull. Soc. Géog. A.O.F. Paris, N 4, 31 déc. 1907, pp. 287-297, 1 carte h. t.
18. CHAREST, P. (1969). B F
Relations inter ethniques et changements socio-économiques dans l'agglomération de Niéméniki à Séguékho, à Touba Diakha.
 Cahier du C.R.A., N 9, in Bull. et Mém. Soc. Anthr. Paris, 5, XII série, fasc. N 1-2, pp. 101-229.
19. CHATAIGNIER Abel (1963) A B F
Les populations du cercle de Kédougou. Cah. Du C.R.A., N 1, in Bull. et Mém. Soc. Anthr. Paris, XI^e sér., t. 5, fasc. N 1-2, pp. 87-111.
20. CISSE Mamadou, CONDAMIN Michel (1969) A B F
Notes toponymiques. Le Parc national du Niokolo-Koba, fasc. III, Mém. IFAN, N 84, Dakar, pp. 11-18, 1 carte dépl. H.t.
21. CONDAMIN, Michel (1966) A B F
Suggestion sur l'amélioration du tourisme au Parc national du Niokolo koba.
 Dakar, IFAN, 1966, 27 cm, 13 p dactyl., 1 carte
22. CUISINIER-RAYNAL, Arnaud (1997) C
Entre parc naturel et forêt classée : réponses paysannes à une contrainte extrême. L'exemple de villages de Diéoun diala, Bantankountou et Mansadala au Sénégal oriental.
 Université Montaigne de Bordeaux III, UFR de Géographie, 196 p.
23. DIOP Ibrahima (1996) A F
Les enjeux de la conservation au PNNK et de sa Région.
 Colloque panafricain sur la gestion communautaire des ressources naturelles et le développement durable, Harare, juin 1996, 9 p.
24. DIRECTION DES PARCS NATIONAUX (1991) A F
Rapport de synthèse sur les journées de réflexion des Parcs nationaux et réserves du Sénégal.
 Dakar, 31 janvier / 1 février 1991.
25. DIRECTION DES PARCS NATIONAUX (1991) A F
Parc national Niokolo-Badiar : Réhabilitation de l'aire Protégée et éco-gestion de sa périphérie.
 Document de projet, Dakar, DPNS/ORSTOM, 1991, 32 p
26. DIRECTION DES PARCS NATIONAUX (1993) A F
Le Parc national du Niokolo koba : Livre blanc. Dakar, mai 1993, 52 p.
27. DUPIRE Marguerite (1963) A B F
Matériaux pour l'étude de l'endogamie des Peuls du cercle de Kédougou (Sénégal oriental).
 Cah. Du C.R.A., n 2, In Bull. et Mém. Soc. Anthr. Paris, t. 5, XI série, fasc. n 3-4, 1963, pp. 223-298, 5 fig., tabl.
28. DUPRE, G. (1963) B F
Note sur les Bassari. Notes manuscrites déposées au C.R.A., Musée de l'Homme, Paris.
29. DUPRE Georges (1965) B F
Aspects techniques et sociaux de l'agriculture en pays bassari (Enquête à Etyolo, département de Kédougou, Sénégal oriental).
 Cah. Du C.R.A., n 3, In Bull. et Mém. Soc. Anthr. Paris, XI^e sér., t. 8, n 1-2, pp. 75-159, 22 fig., 9 tabl., bibliog.
30. DUPUY André-Roger (1968) A B F — —
Relation d'une reconnaissance pedestre sur la rivière Koulountou (partie Ouest du PNNK). in :
 Bulletin de l'AASNS, Dakar, n 23, mai - juin 1968, p 33/41, 1 carte. p 3541 (1968).

31. EQUIP. EX : Programme d'appui aux collectivités locales. (1994). F
Susciter une dynamique participative dans un cadre de partenariat opérationnel. Thème central : Tourisme intégré / Environnement / Communication / Destination Sénégal oriental, 17 p.,
32. FAURE Ulysse (1956) B F
Compte rendu de tournée. Projet d'agrandissement et organisation du Parc national du Niokolo-Koba. Dakar, Inspection générale des Eaux et Forêts et Chasse, mars 1956, 27 cm, 11 p.
33. FAYE, Mamadou (1998) C F
Exploitation durable et valorisation du bambou (*Oxytenanthera abyssinica Munro*) en périphérie du Parc national du Niokolo-koba. Exemple du terroir de Tambanoumouya. Mém. maîtrise, UCAD - F.L.S.H., Dépt. Géographie
34. FERRY, M.P. (1967) B F
Pour une histoire des Bédik (Sénégal oriental). Cahier du C.R.A., N 7, in Bull. et Mém. Soc. Anthr. De Paris, 2, XII série, pp. 125 - 148.
35. GESSAIN Monique (1963) A B F
Etude socio-démographique du mariage chez les Coniagui et les Bassari. Réflexions sur l'endogamie. Cah. Du C.R.A., n 2, In Bull. et Mém. Soc. Anthr. Paris, XI^e sér., t. 5, n 3-4, pp. 123-222, 24 tabl., 5 cartes, bibliog.
36. GESSAIN Monique (1965) B F
Notes sur l'usage des cartes dans l'enquête monographique sur Etyolo. Un exemple de méthode interdisciplinaire. Habitat et occupation religieuse du sol. Cah. Du C.R.A., n 3, In Bull. et Mém. Soc. Anthr. Paris, XI^e sér., t. 8, n°1-2, pp. 63-69, 1 fig.
37. GESSAIN Monique (1967) E
Les migrations des Coniagui et des Bassari. Paris, Société des Africanistes, 28,5 cm, 106 p. fig., pl. h. t., bibliog.
38. GESSAIN, Monique (1978) F
Traditions et changement dans les populations Tenda. Colloque de Kédougou (Sénégal oriental), pp. 29 - 31, Bull. Inform. Mus. Nat. Hist. Natur., N 12, Oct.
39. GESSAIN Robert (1963) B F
Introduction à l'étude du Sénégal oriental (Cercle de Kédougou). Cah. Du C.R.A., N 1, In Bull. et Mém. Soc. Anthr. Paris, XI^e sér., t. 5, fasc. 1-2, pp. 5-85, 3 cartes, tabl., bibliog.
40. GOMILA, R. (1963) A B F
Notes sur l'ethnographie des Bédik (Sénégal oriental). J. Soc. Afr. XXXVI, fasc. II, pp. 209-249.
41. GUGLIELMINI, Christine (1997) A C
Conquête pionnière et mise en valeur agricole. Réalisation d'une étude sur le secteur de Médina Gounass. Publication n 16, CRENB. Rapport de Stage, Projet Niokolo-Badiar, juin 1997, 33 p., annexes.
42. HEYMANS, J.C. A F
Utilisation de la faune en périphérie du Parc National du Niokolo koba. Guinée - Sénégal / Projet Niokolo-Badiar : Mission d'appui, 70 p.
43. KANE Ahmadou Fadel (1997) A C F
Etude historique des principaux groupes ethniques des espaces périfrontaliers du Niokolo-Badiar. Modes de construction des territoires traditionnels et découpage colonial. CRENB, Dalaba, publication n°25, août 1997, 49 p.
44. KERHARO Joseph, ADAM Jacques-G. (1964) A B D F
Notes sur quelques plantes médicinales des Bassari et des Tandanké du Sénégal oriental, suivie de la liste avec les noms vernaculaires des végétaux inventoriés dans la région. Bull. IFAN Dakar, Sér. A, t. 26, N 2, avr. 1964, pp. 403-437, 2 cartes, 8 phot.
45. LESTRANGE, M. TH. de (1974) B F
Importance numérique des concessions en fonction des différentes ethnies établies dans la région de Kédougou. J ; Soc. Afr., XLIV, 2, p. 182.

46. MAUNY Raymond (1963) A B F
Contribution à la préhistoire et à la protohistoire de la région de Kédougou (Sénégal oriental). Cah. Du C.R.A., n 1, In Bull. et Mém. Soc. Anthr. Paris, XI^e sér., t. 5, n 1-2, pp. 13-122, 7 fig.
47. MBENGUE, Cheikh Mohamed Tidiane (1996-1997) D F
Impacts socio-économiques de la conservation des ressources naturelles et perspectives de développement local : le cas de Médinakouta dans la périphérie du Parc National du Niokolo koba. Mémoire de D.E.A., Institut des Sciences de l'Environnement, Faculté des Sciences et Techniques, UCAD, Dakar, 79 p.
48. MBOW, Cheikh (1995) C F
Identification et gestion des ressources naturelles du PNNK
 Mémoire de Maîtrise, Département de Géographie, Faculté des Lettres et Sciences humaines, UCAD.
49. MERLIER (de), Daphné (1998) C F
Gestion durable et valorisation du bambou (*Oxytenanthera abyssinica* Munro) en périphérie du Parc national du Niokolo-koba - Rép. du Sénégal.
 Mém. de fin d'études, Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux (Communauté Française de Belgique), 80 p. + ann.
50. MINNER, E. (1969) A B F
A la découverte du Parc national du Niokolo koba et de ses abords en bateau à moteur. PNNK excursion, in Bulletin de l'AASNS, Dakar, N 25, janvier - février 1969, pp. 9/12 P 3541 (1969)
51. NDIAYE Boucar (1996) A F
Etudes préliminaires relatives à l'implantation d'un projet de Game Ranching dans la forêt classée de Diambour (Région de Tambacounda).
 Mémoire de fin d'études pour l'obtention d'un Diplôme d'Ingénieur des Travaux des Eaux, Forêts et Chasse, Ecole Nationale des Cadres ruraux, nov. 1996, 55 pages, annexes.
52. NDIAYE Paul, BA Alioune, DIOP Amadou & SECK Issa (1992) A F
Les aménagements en cours et futurs dans le Parc national du Niokolo koba : analyse des propositions antérieures pour l'atténuation des impacts environnementaux. Perspectives de gestion globale de l'aire protégée et de sa périphérie. UCAD / DPNS / UICN, Dakar, 61 pages + a
53. NDIAYE, Paul (sous la direction de.) (1997) A D F
Plan de gestion du complexe écologique Niokolo Badiar (1998-2003). Publication n 14, CRENB.
54. NDIAYE, Paul (sous la direction de.) (1997) A F
Atlas du Niokolo Badiar. Projet Niokolo Badiar Editeur.
55. NDIAYE Paul, DIENG Pape Meïssa, THIAW Diatou, FAYE Mamadou (2000) A F
Définition des limites du PNNK et de sa périphérie. Conflits et convoitises.
 Projet Niokolo-koba (FAC/FFEM), Dakar, mai 2000, 94 p.
56. NDIAYE Souleye (1990) A F
Le Parc national du Niokolo koba. Analyse de la situation et recommandations en vue de son développement dans un contexte régional intégré.
 Mémoire pour l'Obtention du grade de Maître ès Sciences, Ecole des gradés, Université Laval, avril 1990, 165 p.
57. NOLAN, R.W. (1977) A B F
L'histoire des migrations Bassari, influence et perspective. J. Soc. Afr., fasc. 1-2, pp. 113-122.
58. NOLAN, R. W. (1978) A B F
Migrations des Bassari. Document de travail du Colloque de Kédougou, pp. 19-27
59. PISON, G. (1982) F
Dynamique D'une population traditionnelle : les Peul Bandé (Sénégal oriental). Travaux et Documents, cahiers, N 99, 278 p.
60. RANCON, A. (1894) A B F
Dans la Haute Gambie. Voyage d'exploration scientifique (1891-92).
 Annales de l'Institut Colonial de Marseille, 1 vol., 1 série, II, 2 année, Paris, Soc. D'Edit. Scient., 592 p.

61. RANCON Dr. André (1895) F
Dans la Haute-Gambie. Le Tour du monde, journ., Voyages et des Voyageurs, 2^e sem. 1895, pp. 489-492, 501-504, 513-516, 525-528, 537-540, 549-552, 561-564, 573-576, fig. 1 carte.
62. Rép. du Sénégal [M.E.P.N.] - Rép. Française [M.C.] (1994) A F
Etude de faisabilité sur la réhabilitation du Parc national du Niokolo-koba.
 Rapport provisoire, AFID Consultance, juin 1994, 7 volets, DPNS / Mission de Coopération et D'A.C.
63. SAMB Makhourédia (1967) F
Cérémonie d'initiation en pays Bassari. Sénégal - Carrefour, Dakar, N 3, juill. 1967, pp. 23-28.
64. SEYE El Hadji Amadou Gueye (1993) C F
Première synthèse bibliographique sur la région du Sénégal - Oriental.
 UCAD/ORSTOM, novembre 1993, 26 p.
65. SEYE, EL-HADJI Amadou Gueye (1998) C F
Les paysages et les peuples du Niokholo. Contribution à l'étude des comportements humains face au milieu naturel (Sénégal Oriental). Université de Rouen, ORSTOM, thèse, tome I : 540 p., tome II : Atlas du Niokolo, les paysages et les peuples, 93 cartes.
66. SMITH Pierre (1965) B F
Les Diakhanké. Histoire d'une dispersion. Cah. Du C.R.A., n 4, In Bull. et Mém. Soc. Anthr. Paris, XI^e sér., t. 8, n 3-4, pp. 231-262, 2 pl. H.t.
67. SMITH Pierre (1965) B F
Notes sur l'organisation sociale des Diakhanké. Aspects particuliers à la région de Kédougou. Cah. du C.R.A., n 4, In Bull. et Mém. Soc. Anthr. Paris, XI^e sér., t. 8, n 3-4, pp. 263-302, 2 phot.
68. SYLLA Seydina I.L., NDIAYE Paul et BA Aïda (1996) A F
Parcs nationaux et écotourisme. Projet Niokolo-Badiar, Actes du Séminaire de Simenti, 10 - 14 juillet 1996, 77 pages.
69. SYLLA, S.I. ; SAGNAH, S. ; NDIAYE, P. & BA, M. (1996) F
Etude de faisabilité. Ecogestion de la future Réserve de la Biosphère du Badiar. Rapport définitif, 38 p., Koundara, juin 1996.
70. TARDIFF Jean (1965) B F
Kédougou, Aspects de l'histoire et de la situation socio-économique actuelle. Cah. du C.R.A., N 4, In Bull. et Mém. Soc. Anthr. Paris, XI^e sér., t. 8, N 3-4, pp. 167-230, 1 dépl. 1 tabl., bibliog.
71. THIAW, Diatou (1995) A C F
Essai d'appréciation des valeurs affectées à l'espace et aux ressources naturelles du Niokolo koba. Mémoire de Maîtrise, Dépt. Géographie, Faculté des Lettres et Sciences humaines (UCAD), 172 p, 17 photos, 22 graphiques
72. THIAW, Diatou (1997) A C D F
Bibliographie sur le Parc National du Niokolo koba et ses espaces adjacents.
 Publication n 15 - CRENB, Version provisoire.
73. THIAW, Diatou (1997) A C F
Pour une gestion participative des aires protégées : analyse de la périphérie au niveau des Réserves de la Biosphère du Niokolo koba et du Delta du Saloum, et de la Réserve Naturelle de Popenguine. Mémoire de D.E.A., Département de Géographie, Faculté des Lettres et Sciences humaines, UCAD, 75 p., 4 pl., annexes.
74. TURCO, A. & CASTI, E. (1996) E
Programme de recherche scientifique sur les ressources naturelles comme support à l'institution et à la gestion des Parcs nationaux de Badiar/Niokolo koba et du Haut Niger.
75. UICN/DPNS/ORSTOM A D F
Au pays Tenda, le Parc National du Niokolo koba. Guide à l'usage des visiteurs, 16 p.
76. VIGNE. (1888) B F
Les peuplades des rives Sud de la Gambie. Paris, Revue Scientifique 1888.
77. VILLIERS André (1955) A B F
Chez les Bassari de Haute-Gambie.
 Science et Nature, Paris, N°12, nov.- déc. 1955, pp. 3-8, 10 phot.

IV.2 - LA REGLEMENTATION ET LA LEGISLATION DU PARC ET DE SA PERIPHERIE

NB : [] : lieu de consultation

1. CONDAMIN. M :
La protection de la nature au Sénégal : le Parc National du Niokolo-Koba. Thèse de Doctorat, Université de Paris. [IFAN, BU, CRENB]
2. BORTOLI Louis et HANDSCHUMACHER Pascal :
Etude d'impact d'une route goudronnée sur le Parc National du Niokolo koba. Ministère de l'Équipement, des Travaux et du Logement, et Ministère du Tourisme et de l'Environnement, Direction des Parcs Nationaux, Janvier 1991 Rapport final. [DPN, IRD , CRENB].
3. DIALLO Mamadou :
Etude de faisabilité pour la réhabilitation du Parc National du Nokolo-Koba :Etude juridique. AFID Consultance, juin 1994. [DPN, CRENB, UCAD].
4. DUPUY A. R. :
Le Niokolo-Koba premier grand Parc National du Sénégal Grande Imprimerie Africaine, 1971, 237 pages. [IFAN, BU, CRENB]
5. DUPUY A. R. :
Les Parcs nationaux du Sénégal. Dakar, GIA, 1972, 196 pages. [IFAN, ANS, CRENB].
6. DUPUY A. R. :
Conservation de la nature et Parcs nationaux au Sénégal. 48 pages. [IFAN, CRENB].
7. CHAILAN H., Mamadou DIALLO :
Etude pour la mise en place d'une structure autonome de gestion pour le Parc National du Niokolo-Koba. SOCREGE, juin 1998. [DPN].
8. MBOW Cheikh :
Identification et gestion des ressources naturelles du Parc National du Niokolo-Koba. Mémoire de Maîtrise, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UCAD, 1995. [UCAD, PSO, CRENB].
9. Ministère du Développement Rural et de l'Hydraulique :
Plan d'action forestier. Volume I. Résumé exécutif.
Plan d'action forestier. Vol. II, document principal, 28 pages.
Plan d'action forestier. Vol. III, fiches de projets, Dakar 113 pages. [DEFC].
10. Ministère de Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature/ UICN / DPNS :
Table ronde sur le Parc National du Niokolo-Koba, Ile de Gorée, 28 juin 1993. [DPN, UICN].
11. NDIAYE Mbalo :
Contribution à l'étude du braconnage dans le Parc National du Niokolo koba. Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur des Eaux et Forêt et Chasse, 85 pages, juin 1993, DALABA. [CRENB].
12. NDIAYE O.K. :
Protection et gestion des ressources naturelles au Sénégal. Etude du cadre juridique et législatif :réalisée pour la GTZ [GTZ , UICN].
13. NDIAYE O.K. :
Réhabilitation et Valorisation du Parc National du Niokolo-Koba. Volet n° 3 (Etude juridique), AFID consultance, juin 1994. [DPN, CRENB, AFID].

14. NDIAYE Paul, BA Alioune, DIOP Amadou et Seck Issa :
Les aménagements en cours et futurs dans le Parc National du Niokolo-Koba : Analyse des propositions antérieures pour l'atténuation des impacts environnementaux : Perspectives de gestion globale de l'aire protégée et de sa périphérie. UCAD/DPN/UICN, Dakar, 61 pages plus annexes, 1992. [DPN, UICN, UCAD, CRENB]
15. NDIAYE Paul :
La terre, les mythes : Vécu et fantasmes : le Parc National du Niokolo- Koba : espaces, ressources, enjeux. Volet n° 2, AFID consultance, juin 1994. [DPN, CRENB, UCAD].
16. NDIAYE Paul :
Plan de gestion du complexe écologique Niokolo Badiar (1998/2003). Publ. n°14 [CRENB].
17. PELLE Crinii A :
Extension de la Réserve de la Biosphère en Guinée. Publication n° 20. [CRENB].
18. République du Sénégal :
Code de la chasse et de la protection de la faune. 61 pages, 1986.). [DEFC].
19. République du Sénégal : Ministère de l'Environnement et de la protection de la Nature :
Code forestier, loi du 4 Mars 1993. Décret 95-537 du 11 Avril 1995, [DEFC].
20. République du Sénégal :
Loi n°64-46 du 17 Juin 1964 relative au Domaine National. [ANS].
21. République du Sénégal :
Loi n°96-07 du 22 Mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales. [ANS].
22. République du Sénégal: Ministère de l'Environnement et de la protection de la Nature :
Décret fixant les taxes et redevances en matière d'exploitation forestière. [ANS, DEFC].
23. République du Sénégal: Ministère de l'Environnement et de la protection de la Nature :
Décret n° 85-585 du 24 Mai 1985 fixant le montant des taxes et redevances en matière de chasse et de protection de la faune modifié par le décret n° 87-038 du 12 Janvier 1987. [ANS].
24. République du Sénégal (MEPN)/ République Française (MC) :
Etude de faisabilité sur la réhabilitation du Parc National du Niokolo Koba. Rapport provisoire, AFID consultance, juin 1994, 7 volets, DPNS/ Mission de la Coopération et d'Action Culturelle. [DPN, AFID, CRENB].
25. République du Sénégal :
Loi n° 88-06 du 26 août 1998 portant code minier. [MEM]
26. SYLLA Seydina Issa Laye :
Problématique des Parcs nationaux du Sénégal : cas du Parc National du Niokolo Koba. Thèse Université Laval, Québec. [DPN, CRENB].
27. THIAW Diatou :
Essai d'appréciation des valeurs affectées à l'espace et aux Réserves Naturelles du Niokolo. Mémoire de Maîtrise, 172 pages, Département de Géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, UCAD 1995, Dakar. [UCAD, PSO, CRENB].
- 28 THIAW Diatou :
Bibliographie générale sur le Parc National du-Niokolo-Koba (PNNK), le Parc National du Badiar (PNB) et leur espaces adjacents. Publication n° 15, CRENB- DALABA/ Niokolo. 2^{ème} édition, septembre 1998. [PSO, CRENB].

IV.3. LA FAUNE DU PARC NATIONAL DU NIOKOLO KOKA

En gras le lieu de consultation de l'ouvrage.

1. BENOIT, M. – (1993) **CFR Dalaba DPNS**
Le Niokolo koba et la reconquête des milieux dégradés. Présentation du Livre Blanc sur le Parc national du Niokolo koba, Ile de Gorée, Dakar, 30 juin 1993, 14 p.
2. DIOP, A. – (1992) **DPNS**
Le Parc national du Niokolo koba (Sénégal). Actes du Séminaire de formation et de sensibilisation des gestionnaires des Réserves naturelles et des sites du Patrimoine mondial (Afrique francophone), Niamey (Niger) du 2 au 7 mars 1992, pp 235/240.
3. DIOP, A. – (1992) **DPNS**
Le Parc national du Niokolo koba : réhabilitation de l'aire protégée et éco-gestion de sa périphérie. Note rédigée à l'attention de Monsieur le Représentant de la Banque mondiale au Sénégal, janvier 1992.
4. DPN/ORSTOM – (1991) **CFR Dalaba DPNS**
Recensement de la grande faune terrestre diurne au Parc national du Niokolo koba. Guide de terrain à l'usage des participants, 3^{ème} édition, février 1991.
5. DPN/UICN – (1993) **CFR Dalaba UCAD-GEO DPNS**
Table ronde sur le Parc national du Niokolo koba. Ile de Gorée, 28 juin 1993.
6. DPN/ORSTOM/UICN **CFR Dalaba DPNS**
Au pays Tenda, le Parc national du Niokolo koba, guide à l'usage des visiteurs.
7. DUPUY, A.R. – (1971) **CFR Dalaba IFAN DPNS**
Le Niokolo Koba, Premier grand Parc national de la République du Sénégal. 278 p.
8. DUPUY, A.R. – (1969) **CFR Dalaba DPNS IFAN UCAD-GEO**
Le Parc national du Niokolo koba (Sénégal). Fascicule III, Mammifères (deuxième note), Mémoires de l'IFAN, n° 84, janvier 1969.
9. UNEP/CDB – (1994) **CFR Dalaba UCAD-GEO ISE DPNS**
Convention sur la diversité biologique. Texte et annexes, novembre 1994.
10. Parc national du Niokolo Koba (Projet FAC/FFEM) – (1999) **CFR Dalaba DPNS**
Suivi écologique, bilan annuel juin 1998 – mai 1999.
11. GALAT, G., BENOIT, M., CHEVILLOTTE, H, DIOP, A., DUPLANTIER, J.M., GALAT-Luong, A., & PICHON, G. – (1992) **CFR Dalaba DPNS**
Dénombrement de la grande faune du PNNK, Sénégal 1990 – 1991, juin 1992.
12. GALAT, G, GALAT-Luong, A. & MBAYE, M. – (1998) **CFR Dalaba DPNS IRD**
Abondance relative de quinze espèces de Mammifères et Oiseaux terrestres diurnes au PNNK, Sénégal, évolution 1990 – 1998. Rapport scientifique n° 1, juin 1998.
13. GALAT, G, GALAT-Luong, A. & MBAYE, M. – (1998) **CFR Dalaba DPNS IRD**
Densités et effectifs de quinze espèces de Mammifères et Oiseaux terrestres diurnes au PNNK, Sénégal, évolution 1990 – 1998. Rapport scientifique n° 2, octobre 1998.
14. GALAT, G, GALAT-Luong, A. & MBAYE, M. – (1998) **CFR Dalaba DPNS IRD**
Distribution éco-géographique 1998 de quinze espèces de Mammifères et Oiseaux terrestres diurnes au PNNK, Sénégal. Rapport scientifique n° 3, novembre 1998.
15. SYLLA, S., NDIAYE, P. & BA, A. – (1996) **CFR Dalaba DPNS UCAD-GEO**
Parcs nationaux et éco-tourisme. Projet Niokolo – Badiar, Séminaire de Simenti (parc national du Niokolo koba), 10/14 juillet 1996.

IV.4. LA FLORE ET LA VEGETATION DU PARC NATIONAL DU NIOKOLO KOKA

Ouvrages disponibles à l'Institut des Sciences de l'Environnement

1. ADAM, J.G., 1965 a. Généralités sur la flore et la Végétation du Sénégal. Climat, sols et végétation. Et. Sénégal. N° 9, Connaissance du Sénégal, Centre de Rech. Doc. Sénégal., Saint Louis, fasc. 3, pp. 155 - 214, fig., tab., photo.
2. ADAM, J. G., 1963b. Les plantes utiles du Parc National du Niokolo Koba (Sénégal). (Comment vivre uniquement avec leurs ressources). *Notes Africaines*, 97: 5-21, Dakar, 16 fig.
3. ADAM, J. G., 1966. Composition floristique et différents types physiologiques de végétation du Sénégal. *J. W. African Sci. Assoc.*, 11(1-2): 81-97.
4. ADAM J. G., 1968 b. Sénégal. In *Conservation of Vegetation in Africa South of Sahara; Acta Phytogeographica Suecica* 54, edited by Inga and Olov Hedberg, pp. 65-69.
5. ADAM, J.G., 1963a. Les forêts à *Symmeria-Hunteria* des berges de la Gambie - Koulountou (Sénégal sud-oriental). *Bull. IFAN, Dakar*, sér. A, t. 25, n° 1, p. 24-37, 3 fig 2 cartes.
6. ADAM, J.G., 1965. Tourisme et flore du Fouta-Djalon au Sénégal. *Notes Africaines, Dakar*. n° 105: 12-15.
7. ADAM, J.G., 1968b. La flore et la végétation du Parc National du Niokolo Koba (Sénégal). - *Adansonia*, sér. 2 8(4): 440-459.
8. ADAM, J.G., 1971. Le milieu biologique, flore et végétation. In *Le Niokolo Koba, premier grand Parc National de la République du Sénégal.*, Dakar, GIA, pp. 43-62.
9. AUBREVILLE, A., 1950. Flore Forestière Soudano-Guinéenne, A.O.F.-Cameroun-A.E.F., 523 P.
10. AUBREVILLE, A., 1938. La forêt coloniale. (Les forêts de l'Afrique Occidentale Française). *Ann. Acad. Sci. Colon.*, 9: 1-245
11. AUBREVILLE, A., 1970. Vocabulaire de biogéographie appliquée aux régions tropicales. *Adansonia*, vol. 10, sér. 2, (4): 439-497.
12. BA, A.T., SAMBOU, B., ERVIK, F., GOUDIABY, A., CAMARA, C., DIALLO, D., 1997. Végétation et flore. Parc transfrontalier du Niokolo Badiar. *Niokolo Badiar*, UE.157p.
13. BA, A.T., NOBA, K., 1998. Flore et biodiversité au Sénégal. AAU Reports 39, pp. 27-42.
14. BAUDET, D. et CONDAMIN, M., 1969. Bibliographie générale du PNNK et de sa région. In *Le Parc National du Niokolo Koba (Sénégal)*, fasc. III, Mém. de l'IFAN, n° 84, p. 473-487.
15. BEIGNET, 1986. Les savanes du Niokolo. L'univers du vivant, 16, 1986
16. BERGHEN C. V., 1988. Flore Illustrée du Sénégal, tome IX, Dakar, Gouvernement du Sénégal, Ministère et du Développement rural, Direction des Eaux et Forêts, 523 p.
17. BERHAUT, J., 1967. Flore du Sénégal, 2ème édition, 485 P.
18. BERHAUT, J., 1971. Gouvernement du Sénégal, Ministère du Développement rural, Direction des E. et F.
Flore Illustrée du Sénégal, tome I, 626 p.
Flore Illustrée du Sénégal, tome II, 695 p.
Flore Illustrée du Sénégal, tome III, 634 p.
Flore Illustrée du Sénégal, tome IV, 625 p.
Flore Illustrée du Sénégal, tome V, 628 p.

19. BONAMOU, C. & CONDE, T. 1997. *Oxytenanthera abyssinica* (Munro) et *Raphia sudanica* (A. Chev.): localisation, activités socio-économiques et les possibilités d'amélioration dans la Préfecture de Koundara. Publication n° 13, CRENB.
20. CAMARA, C. & DIALLO, D., 1996. Etude ethnobotanique dans la préfecture de Koundara. Publication n° 2, CRENB.
21. CAMARA, C., 1997. Etude de la végétation des aires protégées de la préfecture de Koundara. Le Parc du Badiar et la Forêt de Ndama. Cartographie, flore et végétation. Publication n° 9, CRENB.
22. CAMARA, M. C., DIALLO, D., THIES, E., 1995. Les rôneraies de la préfecture de Koundara : état actuel et proposition de gestion. Projet Niokolo-Badiar / CRENB, 64 p.
23. CHEVALIER, A., 1900 b. Les zones et provinces botaniques de l'Afrique Occidentale Française. *Comp. Rend. Hebd., Séances Acad. Sci. CXXX*, 18: 1205-1208.
24. COLE, M. M., 1986. The Savannas, *Biogeography and Geobotany*; Pp. 24-419.
25. CONDAMIN, M., ROY, R., 1969. Le problème des feux de brousse. In *Le Parc National du Niokolo Koba (Sénégal). Vue d'ensemble sur la faune et le peuplement animal. Mémoire de l'IFAN N° 84, Fascicule III*, pp. 58-62.
26. CONDAMIN, M., 1974. La protection de la nature au Sénégal. - Le Parc National du Niokolo Koba. *Notes Africaines*, 143: 57-77.
27. CONDAMIN, M. et ROY, R., 1969. Vue d'ensemble sur la faune et le peuplement animal (état des connaissances au 20 novembre 1968). In *Le Parc National du Niokolo Koba (Sénégal)*, fasc. III. Mémoires IFAN, n° 84, p. 19-67.
28. CONSEIL SCIENTIFIQUE POUR L'AFRIQUE (CSA), 1956. Réunion de Spécialistes du CSA en matière de Phytogéographie [CSA Specialist Meeting on Phytogeography], *Yangambi 1956. CCTA, London, Publ. N°53*, 35 p.
29. COURBOIS, L. 1995/1996. Propositions de méthode de gestion durable du Palmier rônier en zone du Parc national du Niokolo koba (république du Sénégal). Mémoire de Fin d'Etude, faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, 1995-1996, 107 p., annexes.
30. CSE, 1999. Etude diagnostic sur les feux de brousse dans les Régions de Kolda et Tambacounda. *PROGEDE N° IS022/98.65p*.
31. DEKEYSER, P.L. et ROY, R., 1961. Introduction. In *Le Parc National du Niokolo Koba*, fasc. II. Mémoires de l'IFAN, n° 62, p. 9-12.
32. DEKEYSER, P.L. et VILLIERS, A., 1956. Introduction. In *Le Parc National du Niokolo Koba*, fasc. I. Mémoires de l'IFAN, n° 48, p. 9-22.
33. DIALLO, D., 1997. Etude de la végétation des aires protégées de la préfecture de Koundara. La forêt classée de Ndama. Cartographie, flore et végétation. Publication n° 10, CRENB.
34. DIALLO, D. & CAMARA, C., 1996. Proposition des grandes lignes sur la gestion durable des rôniers de la préfecture de Koundara. Publication n° 3, CRENB.
35. DIALLO, O. et BAH, M.O., 1996. *Elaeis guineensis* et *Vitellaria paradoxa* : distribution et importance socio-économique dans le Parc National du Badiar, la forêt classée de Badiar Sud et leurs environs. Publication n° 5, CRENB.
36. DIONE, D., 1996. Étude biosystématique et chimiotaxonomique de sept espèces du genre *Combretum* au Sénégal. *Thèse doctorat de 3^e cycle Département de Biologie Végétale, Université Cheikh Anta Diop, Dakar*. 142 pages

37. DIRECTION DES EAUX ET FORETS, 1992. Gestion des ressources vivantes au Sénégal. Propositions pour une stratégie. 16 pages
38. DUPUY, A. R., 1969a. Action des feux de brousse sur la végétation. *Bull. AASNS.*, 26: 15-20.
39. DUPUY, A. R., 1969b. Guide du Parc National du Niokolo Koba. 37p., 21 phot., dess., 1 cart. dépl. coul. h.t.; G.I.A., Dakar.
40. DUPUY, A. R., 1969c. Les feux de brousse et la faune. *Bull. AASNS.*, 28: 23-24.
41. DUPUY, A. R., 1968. A propos des feux de brousse. In *Bulletin de l'AASNS*, Dakar, n° 21, Janv-Fev. 1968, pp. 27-28.
42. DUPUY, A.R. Le Parc National du Niokolo koba. Photographies et textes, Livre de poche
43. FREDERIKSEN, P. & LAWESSON, J. E., 1992. Vegetation types and patterns in Senegal based on multivariate analysis of field and NOAA-AVHRR satellite data. *Journal of Vegetation Science*, 3: 535-544.
44. GESSAIN, M., 1956. Ceinture de bassari en feuille de rônier pyrogravée. Notes Africaines, Dakar, n° 72, oct. 1956, pp. 112-113, 4 fig.
45. FAYE, M., 1998. Exploitation durable et valorisation du bambou (*Oxytenanthera abaca Munro*) en périphérie du Parc national du Niokolo-koba. Exemple du terroir de Tambanoumouya. Mém. maîtrise, UCAD - F.L.S.H., Dépt. Géographie
46. GIFFARD, P. L., 1959. Le Parc national du Niokolo-Koba. Bois et Forêts des Tropiques, Paris, N° 64, mars-avr. 1959, pp. 25-33, 1 carte, 8 fig.
47. GOUDIABY, A., 1996. Étude de la flore et de la végétation du site de Dindéfello (Sud-Est du Sénégal), éléments pour un aménagement. *Thèse doctorat de 3è cycle es-Sciences de l'Environnement*, Université Cheikh Anta Diop, Dakar.
48. GOUDIABY, A., AGNE, A.E., 2000. Gestion intégrée et communautaire de la biodiversité du Parc National du Niokolo Koba (Sénégal). *MEPN, PICCB*, 36p.
49. GUEYE, M., 1976. Le parc national du Niokolo koba. in *Senesylva*, n° 6. avril 1976, pp. 12/15
50. I.G.N., 1966. Le Parc national du Niokolo kolo au 1/200.000"
51. I.G.N., 1971. Carte de l'Afrique de l'Ouest au 1/200.000. Feuille Tambacounda. I.G.N. (1971) Carte de l'Afrique de l'Ouest au 1/200.000. Feuille Kédougou.
52. KALOGA, B., 1971. Le milieu physique - Sols. In *Le Niokolo Koba premier grand Parc National de la République du Sénégal*, G.I.A. Dakar, pp. 38-41, (Ed. DUPUY A.R.).
53. KERHARO, J., ADAM J. G., 1964. Notes sur quelques plantes médicinales des Bassari et des Tandanké du Sénégal oriental, suivie de la liste avec les noms vernaculaires des végétaux inventoriés dans la région. *Bull. IFAN Dakar, Sér. A*, t. 26, N° 2, avr. 1964, pp. 403-437, 2 cartes, 8 phot.
54. KERHARO, J. et ADAM, J.G., 1974. La pharmacopée sénégalaise traditionnelle : Plantes médicinales et toxiques. Paris, Ed. Vigols et Frères, 1011 p.
55. LAEGAARD, S., 1998. Grasses in steppes and savannas of Senegal. *AAU Reports* 39, pp. 163-167
56. LAWESSON, J. E., 1991. Vegetation Changes in Senegal. A Photographic Perspective. 14-21.
57. LAWESSON, J. E., 1995. Study of woody flora and vegetation in Senegal. *Opera Botanica*, 125, Copenhagen, 172p.

58. LAWESSON, J.E., 1992. Study of woody flora and vegetation in Senegal. Ph.D. Thesis, Department of Botany, Institute of Biology, Aarhus University, 68, DK-8240 Risskov, Denmark.
59. LEBRUN, J-P. & STORK, L. A., 1991. Enumération des plantes à fleurs d'Afrique tropicale - vol.I, Généralités et *Annonaceae* à *Pandanaceae*.
60. LEBRUN, J-P. & STORK, L. A., 1992. Enumération des plantes à fleurs d'Afrique tropicale - vol.II, *Chrysobalanaceae* à *Apiaceae*.
61. LEBRUN, J-P. & STORK, L. A., 1995. Enumération des plantes à fleurs d'Afrique tropicale - vol.III, Monocotylédones: *Limnocharitaceae* à *Poaceae*.
62. LEBRUN, J-P., 1973. Enumération des plantes vasculaires du Sénégal. Etude Botanique vol.2. *IEMVT*, Maisons -Alfort.
63. LO, H.M., et SAMBOU, B., 1988. Contribution à la connaissance du milieu écologique de *Borassus aethiopicum* Mart. *Notes de biogéographie*, n° 3 Nov. 1988, pp.: 57-66.
64. LOUPPE, D. & al., 1995. Effets des feux de brousse sur la végétation. *Bois et Forêts des Tropiques* 245, 3^e Trimestre, pp. 59-69.
65. MADSEN, J., DIONE, D., TRAORE, S.A., et SAMBOU, B., 1996. Flora of Niokolo Koba National Park, Senegal. In *The biodiversity of African Plants. Proceedings of the XIVth AETFAT Congress*, 1994, Wageningen. Kluwer, Dordrecht. Van der Maesen et al. Eds, pp. 214-219.
66. MADSEN, J. E. & SAMBOU, B., 1998. Notes on composition and dynamics of woody vegetation. In *Niokolo Koba National Park, Senegal*. AAU Reports 39, pp. 235-244.
67. MBAYE, A., 1982. Impact du feu sur la végétation dans le secteur de Simenti au Parc National du Niokolo Koba. *Rapport de Stage, Ministère de l'agriculture, Dakar*.
68. MBENGUE, C.M.T., 1997. Impacts socio-économiques de la conservation des ressources naturelles et perspectives de développement local : le cas de Médina-Kouta dans la périphérie du Parc National du Niokolo Koba. *Mémoire de DEA. Institut des Sciences de l'Environnement*. Ucad
69. MBOW, C., 1995. Identification et gestion des ressources naturelles dans le Parc National du Niokolo Koba. *Mémoire de Maîtrise. Département de Géographie. UCAD (Sénégal)* 130p.
70. MBOW, C., 2000. Etude des caractéristiques spatio-temporelles des feux de brousse et de leur relation avec la végétation dans le Parc National du Niokolo koba. Thèse de doctorat de 3^e cycle es-Sciences de l'Environnement, Université Cheikh Anta Diop, Dakar 120 pages
71. MEPN, 1998. Monographie Nationale sur la Biodiversité au Sénégal 82 p.
72. MEPN, 1999. Stratégie Nationale et Plan National d'Actions pour la conservation de la Biodiversité, 92 p.
73. MICHEL, P., 1973. Les bassins des Fleuves Sénégal et Gambie : Etude géomorphologique. Doct. d'Etat . Mémoires de l'O.R.S.T.O.M. n° 63, 3 tomes, 753p. 170 fig. cartes h.t. photo.
74. RICHTER, M. S., 1993. Contrôler l'invasion du *Mitragyna inermis* et du *Mimosa pigra* dans les mares du Parc National du Niokolo Koba
75. ROURE, G., 1956. La Haute-Gambie et le Parc National du Niokolo Koba. Dakar, *G.I.A.*, 24,5 cm, 192 p., fig., phot., cartes dépl., bibliog.
76. SARR, A., 1997. Etude des graminées du Complexe écologique Niokolo-Badiar. Publication N° 8, Centre de Recherche Ecologique Niokolo-Badiar (CRENB), 52 pages.

77. SCHNEIDER, A., et SAMBOU, K., 1982. Prospection botanique dans les Parcs Nationaux du Niokolo Koba et de Basse Casamance. In *Recherches Scientifiques dans les Parcs Nationaux du Sénégal*. Mémoire de l'IFAN, 92 :101-122.
78. SONKO, I., 2000. Etude des effets des régimes de feux dits précoces et de feux tardifs sur la flore et la végétation ligneuses des plateaux du Parc National du Niokolo Koba. *Thèse doctorat de 3^e cycle es-Sciences de l'Environnement*, Université Cheikh Anta Diop, Dakar. 123 pages
79. SONKO, I., 1998. Dégradation des populations de bambou (*Oxytenanthera abyssinica* A. Rich. Munro) de la Région de Kolda (sud du Sénégal). *AAU Reports* 39, pp. 225-233
80. TAKFORYAN, A., 1993. La conservation des Espèces et le développement local : le cas du Parc national du Niokolo koba (Sénégal). Mémoire de D.E.A., Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Septembre 1993, 185 p..
81. TANDIA M, 1994-1995. Perception et gestion durable des paysages de versants en pays Bassari sénégalais. Mémoire de Maîtrise UER de Lettres et Sciences humaines, Section géographie, Module d'Environnement, Université de Saint Louis, 226 p., 9 planches.
82. TAPPAN, G., WOOD, E., HADJ, A. & BODIAN, A., 1994. Le suivi des changements au niveau des ressources naturelles au Sénégal. Premières Evaluations Dérivées des Etudes sur le Terrain. *EROS Data Center, U.S. Geological Survey; Sioux Falls, South Dakota, 57198, USA.*
83. THIAW, D. 1994 – 1995. Essai d'appréciation des valeurs affectées à l'espace et aux ressources naturelles du Niokolo koba Mémoire de Maîtrise, Dépt. Géographie, Faculté des Lettres et Sciences humaines (UCAD), 172 p, 17 photos, 22 graphiques
84. TIONE, L. A. 2000. Biologie de la reproduction et étude de l'impact de l'exploitation des feuilles et des fruits sur la productivité des rôniers. *Thèse de Doctorat de Troisième Cycle, Département de Biologie Végétale. FST, UCAD-Dakar*, 139 pages
85. TOUPET, C., 1971. Climat. In *Le Niokolo Koba premier grand Parc National de la République du Sénégal*. Association des Amis des Parcs Nationaux du Sénégal. GIA Dakar, pp. 15-19.
86. TRAORE, A., 2000. Etude de la reproduction et du développement de *Saba senegalensis* (A. DC.) Pichon au Sénégal. *Thèse de Doctorat de Troisième Cycle, Département de Biologie Végétale. FST, UCAD-Dakar*, 100 pages.
87. TRAORE, S. A., 1997. Analyse de la flore ligneuse et de la végétation de la zone de Simenti (Parc National du Niokolo Koba), Sénégal Oriental. *Thèse de Doctorat de Troisième Cycle, Département de Biologie Végétale. FST, UCAD-Dakar*, 139 pages.
88. TRAORE, S. A., 1998. Quelques caractéristiques de la régénération naturelle des espèces ligneuses du Parc National du Niokolo Koba (Sénégal oriental). *AAU Reports* 39, pp 275 - 284
89. TROCHAIN, J., 1940. Contribution à l'étude de la végétation du Sénégal. Mem. IFAN, n° 2, Larose, Paris, 433 p., 30 fig., 30 pl. photos h. t.
90. TROCHAIN, J., 1957. Accord Interafricain Sur La Définition Des Types De Végétation de l'Afrique Tropicale. - Bull. Inst. Etudes Centrafr. Nouvelle sér. (13-14): 55-93.
91. VIEILLEFON, J., 1971. Le milieu physique. - Sois. In *Le Niokolo Koba premier grand Parc National de la République du Sénégal*. (Ed. A. R. DUPUY). G.I.A., Dakar. pp. 37-41.

